



PLANTARUM RARIORUM
HORTI CÆSAREI SCHOENBRUNNENSIS

DESCRIPTIONES ET ICONES.


OPERA ET SUMPTIBUS

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN.

VOL. III

PROSTAT VIENNAE APUD C. F. WAPPLER; LONDINI APUD B. BY J. WHITE; LEODORNI BATAVORUM APUD
S. BY J. LUCIEMAN.

1798.



OLEA EXASPERATA.

Olea foliis oblongis; paniculis terminalibus; ramis tuberculose exasperatis.

Caulis plures, arborescentes, teretes, pollicem crassi, quinquepedales, erecti, fusci, punctulis exasperati. Rami subvirgati, patuli, similiter punctati. Folia opposita, in quibusdam individuis etiam ternis, omnium brevissime petiolata, oblonga, obtusa cum mucrone reflexulo, integerrima, glabra, coriacea, firma, plana, a lescencia ad quatuor uncias longa. Panicula terminalis, trichotoma, floribus numerosis onusta. Perianthium campanulatum, punctatum, viride; ore quadridentato. Petali alii tubus brevissimus; lacinae ovales, acutulae, patentissimae, magnae. Filamenta duo, opposita, crassa, purpurea, antico margine inaequalia, brevia, patentissima. Antherae didymae, erectae. Germen & stylus purpurei. Stigma viride. Drupa ovalis, obtusa, pili magnitudine, ex partem fusca, glabra. Nux osses, ejusdem figurae, monospermae.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Majo. Fructescit Decembri. Tabula sinit ramum florentem, folia ternis ex alio ramo, paniculam frutescentem, florem auctum utriusque conspectum, auctumque flamen cum anthera integra eademque post pollinis explosionem.

SALVIA HIRSUTA.

Salvia tota hirsuta; foliis oblongo-ovalis, crenatis; floribus spicato-verticillatis; bracteis subrotundis, acutis.

Ex radice annua & ramosa caulis prodit quadrangularis, hirsutus, erectus, totus ramis axillaribus oppositisque ornatus, semipedalis aut paulo altior. Rami quadrangulares, hirsuti, patuli. Folia sunt opposita, petiolata, ex oblongo ovato, crenata, rugosa, utriusque & ad oras villosa, uncialia. Verticilli spicati, erecti, sexflori, terminales. Bracteae subrotundae, acutae, concavae, erectae, hirsutae, cillatae, virides. Pedicelli brevissimi. Calyx hirsutus, striatus, bilabiatus, compressus, erectus; labio superiori integro mucronato, inferiori bidentato. Corolla calyce duplo longior, erecta; tubo albido; limbi caerulei galea oblonga, obtusa, connivente, labio tripartito in lacinas laterales oblongas breves obtusasque & in mediam semilobam.

Patria sic ignoratur. Sub die floret aestate. Tabula exhibet totam plantam florentem.

SALVIA PURPUREA.

Salvia foliis cordatis, serratis, cauleque glabris; verticillis spicatis; calycibus tomentosis, coloratis.

Salvia foliis ovato-acutis, serratis, glabris; calycibus tomentosis, coloratis. *Cavan. Icon. vol. 2. pag. 32. tab. 166.*

Ex radice perenni caules attolluntur plures, annui, erecti, tetragoni, ramoli, glabri, virides, basi calamus cralli, tres quatuorve pedes alti. Folia sunt opposita, aequaliter serrata, acuta, venosa, glabra; inferiora cordata, triuncialia, & longe petiolata; summa magis ovata & brevissime petiolata; petiolis glabris, subtus duabus glandulis minutis sussultis. Verticilli terminalis, densi, spicati, varie multiflori, erecti, tres quatuorve uncias longi. Bractea minute, acutae, deciduae. Calyx tubulosus, violaceus vel in albedinem magis vergens, subtiliter tomentosus, bilabiatus, acutus; labio superiore integro, inferiori bifido. Corolla calyce quadruplo longior, purpurea. Galea oblonga, connivens, emarginata, erecta, foris villosula. Labium inferius patentissimum, superiora versus sensim latefcens in marginem subrotundum & obtuse trilobum. Genitalia generis.

Crescit in Mexico. Floret in caldario hieme. In tabula statuitur pars superior caulis florentis.

SALVIA TILIAEFOLIA.

Salvia foliis subdeltoidibus, crenato-serratis, acutis, rugosis; spicis verticillatis; calycibus ad angulos hirtellis.

Salvia foliis cordatis, rugosis, crenato-aequaliter serratis, acutis; calycibus glabrescens, urticatis. *Vahl. Symb. 2. pag. 7.*

Planta annua, tota testa foetidula, ad lentem villosula, valde ramosa, tripedalis. Caulis tetragonus, quadrifurcatus, medulla alba saretus, erectus. Folia latissime ovata sive deltoides-ovata, acuta, obtusissime serrata, nonnunquam magis crenata, venosissima, rugosa, opposita, longiora fere quadriuncialia cum petiolo hirtulo biunciali; summa subcordata. Rami terminales, erecti, approximate verticillati, semipedales & ultra. Verticilli numero inaequo multiflori sussultantur bracteis minutissimis. Flores parvi insident pedicellis brevibus & patentissimis. Calyx virens & hirtulus. Corolla caerulea calycem superat. Filamenta & stigma caeruleant.

Ignoratur patria. Floret in caldario aestate. Statuitur pars summa caulis & auctus Boe.

SALVIA ABLATA.

Salvia caule suffruticoso, hispido; foliis cordatis, crenatis, acutis, rugosis, viscosis; glandulis duabus infropetiolaribus; spicis verticillatis.

Ex semine nata primo jam autumno caulis ad sexpedalem altitudinem siccitate attollitur, & floret. Subsequia annis caules ex eodem radice exeunt plures suffruticosi, digi-

tum vel & pollicem crassi, humane altitudinis, ramosi, obtuse tetragoni & quadrifidati, scabri, hispidi, seniores fasci, juniores purpurascens. Folia opposita, cordata, acuta, crenata; rugosa, viscosa, villosa, mollia, graveolentia, valde amara, tres quatuorve uncias longa cum petiolo hispido & atro-purpureo. Petiolo subjacent glandulae gemellae, subrotundae & pallide virentes. Pedunculi communes tetragoni, erecti, elongati, terminales inter summa duo folia; utrinque veluti in dichotomia positi, dum ex dictorum foliorum axillis novi ramuli emittuntur, ipsi serius floriferi. Flores verticillati, breviter pedicellati, utrinque terni. Bractea ad verticillos opposita, lanceolata, cuspidata, striata, subferrulata, ciliata, purpurascens, patentissima vel reflexa. Calyx campanulatus, compressus, fere decemfidiatus, hirtus, bilabiatus; labio superiori subrotundo, acutulo, amplo; inferiori bipartito in laciniis semiovatas & acutas; utroque labio erectis & ejusdem longitudinis. Corollae foris villosa tubus albus; limbus albus & calyce duplo longior; limbus saturate caruleus, ringens. Gales erecta, oblonga, emarginata, connivens. Labium trilobum, patentissimum, galea longius; lacina media subrotunda, emarginata, amplissima; lateralibus oblongis, obtusis, parvis, medio approximatis. Genitalia galeae includuntur. Planta primi anni stricto habitu suo foliisque majoribus multum differt ab adultiore.

Crescit in Mexico. Floret sub die Augusto & Septembris; hiemem agens in tepidario. Sinit tabula summam partem caulis primi anni; & racemum jam elongatum ac fructescens.

256.

SPERMATOCOE RUBRA.

Spermatocoe hirsuta; foliis ovatis, summis quaternis; capitulis terminalibus.

Radix ramosa, annua. Cambis quadrangularis, rufosus, erectus, pilis albidis decorsumque flexis hirtus, tripedalis, basi digitum minimum crassus. Rami cauli similes, patuli vel magis erecti, oppositi quidem, sed sic ut alter maneat brevissimus, imo saepe vix evolvatur. Folia sunt opposita, ovata, basi saepe angustata, acuminata, laevigatissima, utrinque hirtula, subtus cristata, pedicellata, majora fere quadrifidalia cum petiolo axillari. Petioli ad basin connectuntur utrinque stipula late amplexicauli, hirsuta, truncata cum oris setas erectas hispidasque emittentibus. Folia terminalia quaterna, sessilia & patentissima; plura, & capitula subdividuntur. Capitula terminalia, densa, sessilia, ampla. Flores erecti, saepeolentes, setis albis interflucti. Perianthium quadripartitum, superum, persistens; foliolis linearibus, acutis, erectis, aequalibus, setose ciliatis. Corollae tubus subuliformis, longissimus, erectus. Limbi quadrifidi lacinae lanceolatae, acutulae, planae, aequales, patentissimae, tubo duplo breviores. Filamenta quatuor, filiformia, patula, longitudine corollae, cujus sauci innata. Antherae oblongae, incumbentes, villosae, violaceae. Germen inferum, glabrum. Stylus capillaris, erectus, corolla longior. Stigma bifidum, patens. Calyx in pericarpio integer persistit, & sic abscedit. Semina oblonga, rugosa, fusca.

Patria nobis ignota est. In calidario floret a Septembri ad Decembrem. Tabula exhibet caulae florantis summam partem; auctum germen cum calyce.

IXORA AMERICANA

Ixora foliis lanceolatis, ternis

Ixora foliis ternis. lanceolato-ovatis, floribus pyriformibus, Lam. Bot. pag. 53

Ixora (ternifolia) foliis ternatis, lanceolatis, subsessilibus, floribus fasciculatis, Ponce
 1812. *Essai de bot.* pag. 4. fig. 3. *tab.*

Caules plures, suffruticosi, erecti, parvis ramosi, teretes, villosuli, sesquipeda-
 les, pennam columbinum crassi. Folia ternata, breviter petiolata, lanceolata, acuta,
 integerrima, utriusque & ad oras villis brevissimis scabra, patentissima vel reflexa, unam
 alterave unciam longa. Stipulae subulatae, erectae, ternae, cum foliis alternantes.
 Pedunculi terminales, plures, erecti, triflori, etiam semel dichotomi, scabri, sensu-
 ciani vel unciarum longi. Flores modesti, erecti. Calyx & germen hirta. Corolla coe-
 ca, foris villosula, uncialis. Antherae flavae. Pericarpium apud nos non perve-
 nit ad maturitatem.

C. I. *Leontodon tetraphyllum*, superum persistens. Foliis lanceolatis, acuminate
 patentissimis

C. II. *monoperata*. Tubus vinctus brevissimus erectus. Lambae quadrifidi & bre-
 vissimi lacinae ovales, obtusae, patentissimae

STAM. Filamenta quatuor, subulata, tota fere quatuor tubo corollae adnata.

PIST. Germen quadrifidum barbata cum vertice ultra calycis osium prominente subhi-
 da. Stylus subulatus, erectus, tubo corollae brevior. Stigma oblongum, obtusum

PIST. bucculare

Sem. hirta

Crescit in Mexico. In caldario floret aestate. Tabula sistit caulem florentem, co-
 rollam longitudinaliter discissam cum staminibus, pistillisque cum calyce

PLANTAGO BRSUTA

Plantago foliis linearibus, ciliatis. Spica cylindrica, scapo hirsuto. *Thunb. prod.* pag. 29.

Radix perennis, graciliter fusiformis, sesquipeda longa, fusca, fibris aucta. Tu-
 pra terram in aereis caulis prominentibus hirsutisque foliorum praetentorum ciliata
 prolongata. Undem sic cum multitudine. Folia linearia, obtusa, imbricatum pluribus
 sublinearibus, acuta, integerrima, crassula, nonnunquam subcanaliculata, hirsuta, cilia-
 ta, subnervosa, erectiuscula, plus minus sesquipeda longa, in aliis unam tertiam un-
 ciam lata, in aliis duplo angustiora. Scapi teretes, villosi, erecti, foliis saepe longiores.
 Spica cylindrica, a duabus ad quatuor uncias longa, calumna crassa, erecta. Flores
 parvi. Semen nigrum & pubescentes praecedunt filamentis multo brevioribus. Semen
 oblonga, fusca.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret totam aetatem. Tabula exhibet te-
 4. *tab.*

PRIMULA CORTUSOIDES

Primula foliis cordato-ovatis, lobatis umbella erecta

ref. 4. pag. 85. tab. 25. fig. 1

Ex radice perenni folia in orbem prodeunt plurima, orta cordata, ceterum ovata, teres, erectae, dense villosae, octo unciis altius, pennam columbinam crassius. Floresque axillares, involucris foula tot quot pedicelli, lanceolata, acuta, concava, erecta, quatuor unciis longioribus, quatuor unciis altius, quatuor unciis crassius. Antherae quatuor unciis longioribus, quatuor unciis altius, quatuor unciis crassius. Stigmata quatuor unciis longioribus, quatuor unciis altius, quatuor unciis crassius. Bacca quatuor unciis longioribus, quatuor unciis altius, quatuor unciis crassius.

Crescit in Sibiria. Floret Junio & Julio. Tabula sistit totam plantam, per calicem scapo suo profifero luxuriantem.

PSYCHOTRIA UNDATA

caulis, acuminatus, pedunculis terminalibus, subtrichotomis

Tota glabra. Caulis fruticosus, teres, fuscus, digitum crassus, tres quatuorve unciis longus, supra nitida, tres quatuorve unciis longa. Stipulae albae clausae geminae formae, pedunculis terminalibus, subtrichotomis, multiflori, bracteae. Flores plurimi sessiles. Perianthium quatuordecimlobum, superuum. Petali albi tubus cyathii unciis oblongis, subtus infra apicem gibbosis. Filamenta quinque, filiformia superne spithalata, erecta, infra mediam partem tubi corollae orta, eodem paulo longiora. Antherae oblongae, didymae, albae, adnatae interno parieti filamentorum.

Inflorescentia pedunculata. Bacca subrotunda, parva, rubra

Crescit in insulis Bahamaensibus. Floret in caldario Julio & Augusto. Tabula ex-

sistemem integram, pullulamque

POMONA DISCOLOR

patentibus; pedicellis frutescentibus cernuis, calycibus punctato-pilosis

Caulis ex radice caesa & ramosa teres, volubilis, hirsutus, perperuus, ramis cordatis, integerrima, acuminata, utrinque pubescentia, subhis nervosa venisque

trivalvis. Semina in quolibet loculamento duo, glabra

Patria mihi ignota est. Floret in calderio a Julio ad Novembriis facta. Fructus maturescunt Novembri. In tabula illudque ramosa borens, ramis frutescentibus p. f. f. & auctum signa

ULMUS PARVIFOLIA

solia lanceolata, equaliter serratis, basi equalibus, utrius, floribus tetrandris

scabrisculo erecto. Folia sunt alterna, subdichotoma, lanceolata argute &

Fl. apud nos, Jul. & Sept. & Oct. in mont. Iberniae & Januario, rariorem sub dio, hiemem agens in tepidario. Tabula effit ramulum borealem cum trimestris quibus ramulis sterilibus, ramulum fructescentem, ramuli partem cum foliis cucullatis, & aucta florem & staminia

MAIERNSIA RUTILA

Radix scabra, pedunculis subbifloris

Ex eodem radice caules exeunt plures, toti procumbentes, teretes, hirsuti. Stipulae lanceolatae, acute, nonnunquam serratae, scissiles. Pediculi ab uno ad tres flores ferentes, oppositifolii, scabri, hirsuti, erecti, unciales. Bractea lanceolatae, acute, hirsutae, parvae. Flores pedicellati, nutantes. Perianthium campanulatum, quatuorfidum, hirsutum, viride, laciniis lanceolatis, acutis, erectis. Corolla tubulosa, lobis ovatis, integerrimis, rotundatis, concavis, emisso ad oras incumbentibus, erectis. Filamenta quinque, basi coacta in unum corollae tubo inclusam, longiora sunt, quam corollae tubo, & hirsuta. Stylus unicus, inferius bifidus, hirsutus, & styli utriusque bifidae & acuminatae, conniventes, hirsutae, fordide flaventes. Germen rotundatum, obverse oratum, quinquefidum. Styli connexi, inferne pilis capitatis hirsuti, superne glabri. Stigmata simplicia, obtusa

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Augusto & Septembri. Siliantur

LIJOSPERMA LANUGINOSUM

Triosperma folio cordato, acuto, utrinque Innuginoso

Radix est tuber carnosum, difforme, foris cinereum, intus purpureum, pugnacitate. Scapus folio precocior, teres, erectus, pennam columbinam crassus, sesqui pedalis debilis & hinc sepe flexuosus, inferne hirsutulus, caeterum glaber, superne longo & laxo racemosus, basi inclusus folio spathaeformi hirsuto. Pedicella uniflorus,

Petalis fordide & pallide flavent cum fascia media utrinque ex purpureo viridi. Anthera tubo. Stamina fusca cum lana albida. Pollum cordatum, acutum, integerrimum, coriaceum, firmum, erectum, utrinque dense lanuginosum, basi cucullatum, disco concavo lateribus revolutum, quatuor uncias longum cum petiolo tereti lanuginoso & tubulato
Cor. Petala sex, ipsa basi connata, infera, lanceolata, acuta; tria exteriora parva, &

placenta tria interiora erecta cum apicibus ad oras connatis & patula omnia post fecundationem in conum erecta
 Stam. Filamenta sex, late lanceolata acuta plana apice interiorum nutans. per anthera breviora. Antherae oblongae, incurvantes
 Pist. Germen superum subrotundum triloculare. Stylus filiformis erectus superne appendiculis clavatis muricatum. Stigma trifidum.
 Per. Capsula triloba, trilocularis, trivalvis
 Sem. solitaria, lanceolata, acuta, pelis simplicibus papiriformibus obfusa.
 Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Septembri & Octobri. Fructescit Novembri & Decembri. Tabula filii totum herbam cum solo antea confecta. idem folium ex dorso. idem secundum tubum & vitium. fraxilla. Bracteam cum vulbi parte capsulam expansam; & aucta pistillum & stamen.

265.

ERIOSPERMUM PUBESCENS.

Eriospermum folio subcordato, acuto, cucullato, pubescente

Radix est tuber carnosum, difforme, rasgle minime subrotundum, fusum intus rubrum. Ex hoc ante folium fraxus egreditur rotunda penna columbina prostrata teres, glaber, erectus, nodus, superne raxe racemosa. Pedunculi uniflori, graciles, patentes, teretes, unciales, ad basin fissula bractea lanceolata, mucosa & acuta. Flores nodosi, erecti, petala albidis cum fasciis viridi, floribus Eriospermi precedentis quoad characterem simillimi. Sic etiam simillima est capsula. Folium post mutata forma unam erectum totum leviter pubescens subrotundum-ovatum acutum antepetuum habens latum divitum ad 1/2 fere unciarum longum maxime petiolo erecto subpubescente cum apice infimo rubro ter. acutum crasso.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Septembri & Octobri. Fructescit Novembri & Decembri. Tabula filii herbam cum folio integram, herbam portionem cum fraxilla flor. etc. & capsula cum involucris expansam.

266

ASPARAGUS CAPENSIS.

Asparagus quatuorfolius. Tab. 266. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Asparagus spinos lateratibus terminatibusque; ramis aggregatis; foliis fasciculatis
 Linn. spec. pag. 437

Asparagus spinos quaternis. Tab. 266. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Asparagus spinos quaternis. Tab. 266. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313

SPONDIAS CYTHREEA.

Spondias panicula terminalibus, foliis ternatis
Spondias cythreea. *Bonner. II. vol. 2. pag. 222. tab. 123*
Evia. *Commerc. msi*

Tota glabra. Truncus orbiceus, teres, brachium crassius, decempedalis, erectus
Folia ternata, ovata, basi cuneata, apice emarginata, nervis distinctis, supra
et infra punctata, utrinque serrata, nervis distinctis, supra et infra punctata,
petiolis brevibus, ternatis, ovatis, basi cuneata, apice emarginata, nervis distinctis,
petiolis brevibus, ternatis, ovatis, basi cuneata, apice emarginata, nervis distinctis,
pedicellati. Calycis semiquinquefolii & ex albo viridis laciniis rotundatis. Petala
decem, subulata, alba, erecta, petalis breviora. Antherae erectae, flavae. Germen
fructibus pendulis

Crescit in Otahite, culta in insula Mauriti; unde in hortum migravit exforme
in caldario floret primo vere; fructescit Novembri. Tabula hinc ramulus borestem,
plurique flores tunc cum fructibus adstant, acia nucem ex pulpa solut

OXALIS FILIFORMIS

Oxalis leopis unifloris, foliis ternatis, linearibus, calycibus obtusis, Mammetis den-
tatis, styis longissimis

Bulbus fibroso-ovatus, tunica fusca tectus. Stipes exsertus, teres, ad sen-
tem pubescens. Fusus, penus columbina gracilior, semipedalis, prostratus, paucisq
mosus, superne folio uno alterove alternante auctus sessilibi, ceterum aphyllus,
umbellam foliorum stormaque terminatus densam. Folia ternata. Petiolus basi articu-
latus, filiformis, teres, ad sentem villosus, plus minus uncialis. Foliola linearia, lu-
plus minus uncialia, ad sentem punctata & raris pilosa, sic conniventia, ut tertia
subee antico & filiformi credi possent. Scapi plures, ad hanc articulati, multiflori
breves, petiolis multo crassioribus, ad sentem villosis, erectissimis, triuncialis
bracteolis alienigenibus superne, minutis, subuncaribus, villosis, sursum erectis
Calycis foliola oblonga, obtusa, erecta, ex viridi fuscoque variegata, pills simplicibus
dense hirsuta & ciliata, ad apicem subius nullis duobus ovalibus aurantiacis instructa

ex flavo siccantes. Laminae obverse ovales rotundatae patentissimae, utraque rubrae, locus ex carneo perinde de altera parte siccatur. Filamenta balli in unum corpus cohaerentia interiora densiuscula superius de parte capitata hirsuta cum denticulis glabra, exteriora glabra. Antherae ovales, incumbentes, flavae. Germen ovatum, hirsutum, virens. Styli longissimi, pilis capitatis hirsuti.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Octobri & Novembri. Tabula exhibet totam plantam florentem, & aucta foliolum calycis & genitalis.

274.

OXALIS FERRUGINATA

Oxalis hujusmodi hirsuta renatis. Locus maritimus. Foliola tripartita (concordantia), lateralibus oblongis, styli intermediis, ciliis simplicibus.

Bulbus ovalis, utrinque acutus, semuncialis, tunica nigricante tectus. Stipes subterraneus, nudi, in umbellam foliosam sorigerumque terminatus. Folia numerosa ternata, ex parte petiolo. Petiolus balli articulus tripartitus, apertus planus, dense villosus, purpurascens, plus minus biuncialis. Foliola subsessilia, medium emittuntur, lateralia magis oblonga, cum pinnis utrinque punctata, punctis hirsutis ciliata. Laciniae villosae & marginibus utrinque serratae, medio immixtae & serrae glabrae, longiora vix semuncialis. Scapi plusculi, balli articulati, unilori, villosi, erecti, cum vertice patentis. In utroque longioribus cum bracteis circa medium appulsi a laterculantibus, minutis & villosis. Calycis foliola lanceolata, acutula, hirsuta, filiosa, inferne rosca, apice saturate virentia. Corolla campanulata, calyce quintuplo major. Ungues erecti, ex flavo patentis. Laminae subrotundae, amplae, integerrimae, patentissimae, albae, foris in altera parte punctis rubris utrinque adjectis. Filamenta balli in unum corpus cohaerentia. Interiora denticulata, aequalia, pilis paucis capitatis minutissimis de via ad ardem conspicuis instructa, cum denticulis glabra. Exteriora glabra. Antherae ovales, incumbentes, flavae. Germen oblongum, superne hirsutum, patentis. Styli intermediis, pilis simplicibus hirsuti.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Octobri & Novembri. In tabula spectantur tota planta florens, & aucta foliolum calycium ac genitalis.

275.

OXALIS VIRGINEA

Oxalis hujusmodi foliis ternatis. Foliola intermedia cum forma, lateribus oblongis, styli intermediis, filamentis edentulis.

Bulbus oblongus, utrinque acutus, cortice fusco velvatus, uncialis. Stipes erectus, hirsutus, teris, medio angustis, medio ex parte longiorum ternatis, totus dense hirsutus, erectus, villosus, viridis, petiolum columbinum crassus, a tribus ad sex uncias longus in umbellam sorigerumque terminatus. Folia ternata, lateralia aliteria, tripartita, plus minus triuncialis, petiolo. Petiolus balli articulus tripartitus, apertus planus, plus minus triuncialis, lateralia magis oblonga, cum pinnis utrinque punctata, punctis hirsutis ciliata. Laciniae villosae & marginibus utrinque serratae, medio immixtae & serrae glabrae, longiora vix semuncialis. Scapi plusculi, balli articulati, unilori, villosi, erecti, cum vertice patentis. In utroque longioribus cum bracteis circa medium appulsi a laterculantibus, minutis & villosis. Calycis foliola lanceolata, acutula, hirsuta, filiosa, inferne rosca, apice saturate virentia. Corolla campanulata, calyce quintuplo major. Ungues erecti, ex flavo patentis. Laminae subrotundae, amplae, integerrimae, patentissimae, albae, foris in altera parte punctis rubris utrinque adjectis. Filamenta balli in unum corpus cohaerentia. Interiora denticulata, aequalia, pilis paucis capitatis minutissimis de via ad ardem conspicuis instructa, cum denticulis glabra. Exteriora glabra. Antherae ovales, incumbentes, flavae. Germen oblongum, superne hirsutum, patentis. Styli intermediis, pilis simplicibus hirsuti.

caulis... folia... pedicellus... stylus...

donatum. Styli intermedi, pilis simplicibus hirsuti
Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Octobri & Novembel. Tabula sil-
dusa plantas florentes; & secta calycis foliolam, genitalia, & pistillum.

FUMIORBIA INACTEATA

caulis... folia... pedicellus... stylus...

Caulis fruticosus, teres, ramulosus, nudus, erectus, ad tactum scaberrimus nec
vel laterales, crassi, subdichotomi, pallide virentes, teretes, glabri, lente producti,
tandem quatuor vel quinque uncias longi, patentes vel reclinati. Bractea ad omnes
divisiones gemellae, etiam saepe later divisiones oppositae, ut vix involucri non
ovatae, integerrimae, acuminatae, concavae, sessiles, patulae, glabrae, subeo-
riatae, intus pallidae, foris viridibus cum affusa purpurea, semumiales aut longiores,
persistentes. Pedicellus unisporus, brevis, crassus, erectus, inter quoslibet duas bra-

cedit. Rarissimi apud nos flores in fructum abeunt; sed plerique non cum pedicellis
suis post anthesin perfectam decidunt. Flos viridis pedicello horizontaliter insidet
Filamenta pallent. Antherae sunt rufae. Capsula est glabra. Omnes flores sunt hermaphroditici. Totam plantam lacte foetet

sa trifurcata, tridua; laciniis duabus superioribus triangularibus, in obtusum
mucronem desinentibus, incurvatis, brevibus; lacina tertia magna, auror-
formi parvula, obtusa, connata, compressa, apice biloba

Con. Petala tria, corolliformia, obtusa, villosa, calyce breviora, erecta, calycis lac-
inferioris superiori fissurae accumbentia, lateralia duo calyci adnata, medium
fundo calycis insertum, ceterum liberum

duae oblongae lateraliter calyci adnatae

m. Filamenta circiter triginta, subulata, non articulata, haecellive extra calycem
excursiva. Antherae subrotundae diuinae

Pist. Germen ovatum, trifurcatum, longe pedicellatum. Stylus unicus, subulatus,
unigus. Stigma simplex

Pa. Capsula subrotunda, trilocularis, trivalvis.

Sem. solitaria.

Patra hic ignota est. In caldario Boret ab Aprilis ad Augustum. Tabula 684 caulis partem summam florentem ante folia, alius ramulum florentem adhuc cum ramulo novo foliolo. Deum 1. florem a tergo, 2. florem superne conspectum cum parte laterali, 3. eundem a latere, 4. perianthi laciniam tertiam majorem a latere, 5. nullam prius eundem laciniam duabus summis 5., ut latentes sic patram glandulae et petala 6. tandem laciniam ceteris majorem in 4. a pedunculo abscissam, in tergo per 2. et 3. discissam, dein sursum elevatam, ut tria petala in conspectum tota prodeant.

277

EUPHORBIA PRUNIFOLIA.

Euphorbia dichotoma foliis subovatis serratis, venis subvillosis, caule erecto glabro floribus in dichotomus ramorum omnium sulcatis, dichotomus superioribus cymose approximatis.

Tota lactesali. Ex radice annua caulis fricte attollitur erectus, teres, glaber, purpurascens cum viride cassum & ultra crassus plus minus pedalis & simplicissimus, de in per plures dichotomias subdiuisus & sic saepe praeter sesquipedalis. Folia in caule sunt alterna & ovata ad ramorum diu lances opposita & serrulata, petiolata, equalia serrulata, summa saepe uti grana utrinque ad litem villosa, subtus ciliatula & palude viridis, supra saturate & teride viridis. longiora quadrangulata. Flores omnes sunt hermaphroditi plerique ex dichotomus cymosis reliqui monopetalis breviter pedunculatis erectis. Dichotomus in ultimis ramis sic coarctantur ut cymis florum densis exstant similes. Intraanthum est oblongum, glabrum, sesquiquadratum, lacinus lanceolatis acutis erectis. Petala aut unicum aut tria, ad dorsum profusa infundibuliformia, ore rotundato & integerrimo, erecta, glabra, viridibus. Styli tres, bilidi. Capsula glabra. Semina subrotunda, fusca.

Patra hodie ignota est. In caldario Boret colam viderem. Tabula 685 plantam florentem maiorem; auctosque duos diversos flores, deinde similes.

278

MESEMBRYANTHEMUM PARVIFLORUM.

Mesembryanthemum foliis auriculato-obovatis cuneatis, impunctatis, distinctis lobis pedunculatis ceteris quatuor foliis duobus longioribus alio brevissimis.

Totum glabrum. Caulis frutescens, diffusus, teres, ab ipsa radice ramosus, cassum & albus, impunctatis densis & nisi uleretur, densis cum ramulis vilius adscendentibus. Folia sunt ovata, biloba subamplexicauli & distincta impunctata lanceolato-linearata obtuse emarginata integerrima ramositate obtusa cum mucrone saepe deficiente non papulosa impunctata nigra uncialia. Pedunculi in ramulis minoribus tenuiores nulli simpliciter & univinculis. Flores minuti. Perianthia tetraply, in folia uno opposita nigra patentissima petalis longiora alia duo lanceolata, erecta, brevissima. Petala numerosa, linearia, alba. Antheris flavis. Styli quatuor, subulati, patentes, corolla breviores. Capsula quadrilocularis.

T. 4

ROSA SEMPERFLORENS.

Rosa perennis, ramulis glabris pedunculis hispida, cune petiolisque aculeatis, petalorum interioribus revolutis.

Rosa chinensis. Jacq. obs. part. 3. pag. 7. tab. 55

Caulis fruticosus, duas trece pedes altus, ramosus, diffusus, teres, glaber, aculeis brevibus sparsis utrinque armatus. Folia alternis, nisi nova petiolo cum nervis a pignis duobus, superiora ternata. Petioli ad lentem villosi, uno alterove aculeo instructi. Foliola ovata, acuminata, serrata cum dentibus apice cartilagineis & fuscescentibus, basi sessilibus, utrinque capitulo serrata utrinque pubescente, utrinque medio nervo alterumve aculeum parvum gerente, exteriorem multo majus. Stipulae petioli adnatae, acuminate, utrinque serratae, utrinque capitulo serratae. Ramuli elongantur in pedunculos terminales, solitarios, unifloros, teretes, hirsutos & duas trece uncias longos. Calycis foliola lanceolato-acuminata, utrinque & ad oras villosa, plerumque integerrima. Corolla parum odorata, plena, profunde rubra, in varietate quadam carnea, petalis brevi post expansionem latera sua retrorsum volventibus. Germen ovatum, glabrum stylis & filamentis coloris corollae habent. Antherae saepe

Crescit in China. Sub dio agit aestatem, hiemem vel totum quoque annum in cultura sic semper florens & a primo scilicet ad septimum huc. Tabula videt ramum fructuosum & floribus florem ex varietate carnea.

CISTUS VAGINATUS

Cistus calycibus lobis obtusis, petalis subter reticulato-rugosis, petiolo basi vaginatus, vaginatis, falcatis. Mill. bot. par. 2. pag. 131

Caulis fruticosus, quadripedalis, teres, erectus, ramosus, ex cinereo fuscus, cortice glabro & lacero. Folia opposita, oblonga, utrinque angustata, acuta, ad lentem obtusa, utrinque & ad nervos utrinque serrata, utrinque & petiolo serrata, sic venosa, duas trece uncias longa; cum petiolo vix semineculibus, pilosis, basi vaginatis & basi in vaginam longiorum pilorum glandulosam magisque quam in vaginam breviorum ciliatam. Stipulae nullae. Pedunculi in unguibus axillaribus uniflori, & praeterea terminalis alius ramosus erecti, crassi, villosi, aliquot uncias longi. Calycis pentaphylli villosi & persistentis foliola duo exteriora ovata, acuta, parva, tria interiora subrotundo-acuminata, ampla, valde concava. Petala magna, rosea, saepe rugosula, potentissima. Capsula ovata, subpentagona, glabra, qui

Crescit in Tencris. Floret Mayo & Junio. Tabula representat ramum fructuosum & ramum fructuosum.

TILIA ALBA

Tilia floribus parvatis instructis, foliis ovatis & ad apicem saepe tumentibus & serratis. *De herb. rel. 2. pag. 130. Hist. arb. pag. 329.*

Tilia americana foliis cordatis, acuminatis, serratis, subtus pilosis, floribus nectario instructis. *De Roy herb. 1. pag. 267. Virginit. pag. 55.*

Arbor apud nos jam trigintapedalis, densissima comosa, trunco erecto semipedalis diametri, ramis junioribus tomento cinereo & ad strium fortissem secedente obductis. Folia sunt alterna, cordata adque saepe anequaliter, acuminata, argute denticulata, saepe subtruncata, venosa, facie viridia & ad lentem veluti tomento pulverulenta, subtus imbricata atque petalis terribus & pilosis. Petalis axillares, foliariis, petalis longiores, supra ortum ovati bractea oblonga integerrima usque adnata & longitudine ipsius petalis superne venose multae. Petalis in parte media ovatis, scutis, concavis, erectiusculis. Petala quinque, oblonga, obtusa, concava, supra apice adnata, ad apicem dupliciter imbricata, imbricatione decursiva foliola totidem, ante petala posita, cui similia, sed minor. Capsula ex subrotundo ovata, styli parte persistente mucronata, obsolete pentagona, tomentosa.

Crescit in America septentrionali. Sub die floret apud nos a medio Junio ad medium Julium, fructescit Septembri & Octobri. Tabula sistit ramulum florentem cum fructibus cum bractea saepe deo tum ramum apertum cum pinnaculis utriusque & semina.

STACHYS COCCINEA

Stachys verticillis sexfloris; foliis oblongo-ovatis, basi cordatis.

Tota fetidula est. Ex radice perenni cautes herbaceae exsurgunt plures, erecti aut basi ascendentes, una cum racemis bipedales, ramosi, acute tetragoni, quadrifidati, asperuli, villosi. Folia opposita, petiolata, ex cordata basi oblongo-ovata, emarginata, subtus rugulosa, utraque villosa, inferiora obtusa, superiora acuta, plus minus tres uncias longa; floralia sessilia, successive minor, tandem bracteiformia. Verticillis sexflori, distantes, multi. Pappuli brevissimi. Calyx villosus, decussatus deorsum. Filamenta rubella longitudine subaequalia, omnia erecta, nec ulla ad latera flexa. Antherae saepe. Stylus capillaris, albus. Stigma bifidum, rubellum, patens.

Patria haec ignota est. Floret a Junio ad Augustum. Silitur caulis parte superior.

LANTANA SALVIFOLIA

Lantana foliis oppositis, ovatis, rugosis, supra asperis, subtus tomentosis; capitulis oblongis, squarrosis, bracteis ex subrotundo acuminatis, caule aeterni.

Frutex plene inermis, quadripedalis, totus ramosus. Caulis tetragonus, rufus, erectus, digitum crassus. Rami tetragoni, oppositi, patuli, juniora scabra. Po-

lla opposita, breviter petiolata, anguste ovata, serrata, rugosa, supra scaberrima & saturate virentia, subtus subtomentosa & pallide virentia nec aspera, a lesuncina ad tres uncias usque odore balsamico praedita. Adum aliæ a thares aditæ opposita & alterni, subteretes, scabri, foliis plerumque breviores. Florum capitula oblonga, cylindrica, densa, erecta, tandem uncinata & strobiliformia. Bractæ imbricatae, ex subrotundo ovatae, acutae, multinerviae, utrinque ad latera villosulae nec scabrae, longitudine tubi corollae. Petalum roseum cum fauce flava. Calyx tubulosus, villosus, aequantiter quadridentatus. Corolla a tubis subrotundis tubo superiore emarginato, bifloro trilobato & obtuso. Drupa subrotunda, violacea. Pulpa concolor, dulcis. Nux fusca, bifurcata, apice bifido acuto parvo, hilicularia. Semina solitaria.

Semina sine titulo ex Promontorio bonae Spei transmissa fuerunt. Sub die florit totum aestatem, fructescit Augusto & Septembri. Hiemem agit in tepidario. In tabula representantur caulis florentis & fructescens pars superior, drupa & nux.

286.

SCROPIULARIA APPENDICULATA.

Scrophularia. Folia cordatis inciso-serratis, glabra, infimis varie appendiculatis terminalibus, compositis.

Tota glabra & fetidula est. Radix perennis, ramosa. Caules anni, plures, acule tetragoni, ramosi, erecti, duos tresve pedes alti. Folia sunt opposita, petiolata cordata vel cordato-ovata, serrato-incisa, acuta vel obtusula, nonnunquam lobato-incisa, quaedam inferiora etiam appendiculato-lobata aut rarius sic bijugata, venoso lacini terminalibus, in caulibus saepe pedales, in ramis breviores, erecta, ex pedunculis ramosa, subdichotoma, mutatoria, patentissima, nullis oppositis, reliquis utrinque alternis, haec ex lanuginata fusculis cujusmodi etiam ad utrumque pedunculos occurrunt. Calycis lacinae sunt ovatae, obtusissimae, concavae, pallide virentes cum orbemembranacea albidula. Corolla modo tota quanta utrinque atropurpurea est cum sola lacinula infima reflexa pallide flaventibus modo tota ex flavo vires, modo iterum ex flavo virescente purpureoque deorsum variegatur. Discus etiam flus in diversis modis idus nigrescit.

Crescit in Africa circa Tunus. Floret a Majo ad Julium. Tabula sistit caulis partem superiorem, folium infimum, & florem varietatem majorem.

287

BIGNONIA GRANDIFOLIA

Bigonia. Folia conjugata, cuneata, lobatis ovatis pedunculis ternis terminalibus, trilobis.

Caulis frutescens, teres, cinereus, glaber, ramosus, debilis, scandens, viginti-pedalis, pollicem crassus. Ramo teretes, punctis ferrugineis extantibus scabri, quoties cum petiolo connatae & pedunculi. Folia opposita, conjugata, cuneata. Petiolus communis crassus, teres, vix uncialis, firmus, partiales glabri, semunciales. Fovola ovata vel ovato-lanceolata, integerrima, acuta, venosula, subcoriacea, firmula, laevissima & saturate virentia, subtus coarsa & pallide viridia, a dimidio ad integrum pe-

frons summo laevem margine hinc. Antherae diductae, utrinque bifidae, ad latus
bifidae. Germen... quatuordecim... pila bellis & hirtum. Stylus plus impu-
bus totus obfuscus.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret a Februario ad Aprilum. Tabula
Hinc ramum florentem; aucta flamen & pistillum.

292.

BERMANNIA HOLOSERICA

Bermannia lousa oblonga, superne serrata, holoserica, ramulis florentibus subdi-
stichis.

Frutex tres quatuorve pedes altus, ab ipsa basi ramosus, diffusus, debilis;
caule basi dignum, raris amplexibus, glabris & seruginosis; amplexibus lobatis
vittatis, cum tere palmatis. Ramuli floriferi saepe distichi sunt. Folia sunt
alternata breviter petiolata, ovata cum basi angustata obtusa supra medium serru-
lata, ceterum integerrima, subtus ciliata pinnatis, utrinque impetiosa, incisa &
hinc hinc a dimota ad diametrum usque. Si plus lanceolata acule utrigerrime
incisa pinnata angustiora. Ramuli multibori terminales compositi patentes
dus multo longiores. Folia in partibus palmifera, perenni usque ad septem pro-
tertia & quatuor partibus pediculis sunt. Bractea ad pedunculum & pe-
dunculum plus hinc aut multo minus. Calyx tripartitus incanus. Petala flava,
saepius duobus longiora. Filamenta hinc imata saepe saepe glabra alba. Antherae
lucidae apud antheras adacta ad medium sursum ceterum glabra. Germen
petiolatum... quatuordecim... pila bellis & hirtum. Stylus
ciliatus, bifidus pila simplicibus sursum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Maio & Junio. Siliatur ramus flo-
rentis aucta ramum & pistillum.

293

MALVA ABUTILOIDES.

Malva caule fruticoso; foliis cordatis, lobatis, tomentosis; pedunculis paucifloris;
fructibus globosis, striatis, loculis oligospermis.

Malva foliis lobatis, vitosis, caule erecto; calycibus brevissimis, capsulis globosis,
striatis, loculis polyspermis. *Lin. spec. pl. pag. 111.*

Malva caule malvarum maximo frutescente, foliis angulatis, planis, tomentosis pe-
dunculo axillari, multifloro. *Cavan. diss. pag. 60. tab. 16. fig. 1.*

Abutilon ulthroides flore crisco, fructu globoso. *Dill. elth. vol. 1. pag. 1. tab.*

Tota inodora. Causis fruticosus, erectus, viginti pedalis & ultra, teres, polli-
cem crassus, senior ex cinereo fuscus & glaber; junior tomentosus, villis albis incanus,
& mollis. Talis etiam ramus. Folia sunt alterna, cordata, acuta, serrata, tota tomen-
tosa & in... septemlobata cum tubo crenato magis in... & tubo utrinque usque
saepius obsoleto, a duabus ad quinque uncias longa, petiolo incano, crassato & ejus-
dem longitudinis. Stipulae subulatae, acutae, erectae, tomentosae, radices. Peduncul-
i summi foliis axillares, solitarii, ramosi, crassi, erecti, tomentosi, pauciflori, re-

pectis. Corolla papilionacea, calycis paulo longior. Vexillum obverse ovatum integerrimum, planum, patentissimum, purpureum. Ala oblonga, obtusa, concava, vexillo concolores, ejusdem fere longitudine, erectae. Carina ala paulo brevior, subcuneiformis, obtusa, erecta, dipetala, pallida cum apice atrovirente. Filamenta decem, diadelphis cum simplici capillari, erecta cum apice ascendente. Antherae oblongae, incumbentes, saevae. Germea teres, glabrum, obtusum, viride, pedicello albo insidens. Stylus filiformis, situ & longitudine laminae. Stigma capitatum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Augusto & Septembri. Tabula representat totam plantam primi anni, auctumque florem.

HELYSARUM UMBELLATUM

radix crum flos ternata pedunculus subumbellatus caule truncato *Lin. s. p.*
par. h. 7.

Helysarium trifloratum arborescens, floribus ex alia fusorum lacinis quibuslibet
Burm. zeyl. pag. 113. tab. 31.

Folium crocodilii. *Rumph. amb. vol. 4. pag. 112. tab. 31.*

Caulis arbusculus, ex semine natus & jam sexennis, est pollicem crassus, quinquepedalis, erectus, teres, nudus, rimosulus, fuscescens. Rami seniores trunci breves, sed juniores villosi ac molles. Folia sunt ternata, alterna. Petioli teretes, villosi plus minus saecunciales. Foliola petiolata, integerrima, obtusa vel acutula, ad oras villosa ciliata, utrinque ad lentem villosula, facie tamen minus, ad angulum acutum ex nervo medio transverse venosa, terminata setula, firmula, lateralia ovata, intermedium late ovatum, majus, trinervale. Supula oppositifolia, semibifida, acuta, concava, appressa, villosa, viridis, folium necdum evolutum amplectens, & jam ante hujus evolutionem decidua, sola remanente ejus calyce. Pedunculi communes axillares, brevissimi, erecti, villosi, sustinent flores plus minus quatuor, laterissime pedicellatos, subumbellatos, bracteis villosis & parvis suffultis, successive expansos, pedicellis patentissimis & villosis. Calyx villosissimus viret. Corolla nivea est. Antherae ochroleucae. Stylus hirsutus. Legumen tomentosum, fuscum.

Cal. Perianthium monophyllum, semiquadrifidum, persistens; uclius Innocentis multinatis, potentissimis, tandem reflexis, quarum summa & ultima duplo latiores sunt lateralibus.

Cor. papilionacea.

Vexillum subrotundum, emarginatum, reflexum, expansum nec compressum.

Alae lineares, obtusae, erectae, carina breviores & triplo anguliores.

Carina longitudinaliter foveolata, obtusa, erecta, longitudine vexilli, ungue dupli brevissima.

Stam. Filamenta decem, diadelpa (simplex & novemfidum), saepe ad angulum rectum inflexa. Antherae oblongae.

Pist. Germe unguere compressum minus obtusum, situ laminae. Stigma nuda.

Leg. Legumen oblongum, compresso-planum, mucronatum, articulatum, articulis plusculis, monoipermis, bivalvibus.

Seem. reniformia.

Crescit in insulis Azoricis. Floret sub fine Junii & Julio hiemem transiens in repidario. Siliuntur ramulus florens, & hujus pars fructiferentis

300.

AGERATUM PUNCTATUM.

Ageratum foliis linearilanceolatis, serratis, utrinque punctatis

Totum inodorum & fere insipidum. Radix annua. Caulis teres, ad lentem villosus totus foliosus duos teres pedes longus, vix calicem crassus debilis hinc decumbens, superne tantum ramosus & ascendens. Rami numerosi, villosuli, luteo-umbellati. Folia sparsa numerosa linearilanceolata, acuta, serrata in petiolum angustata subtus punctis utropreclis supra iudem elevatis dense notata cartilagineo glaberrimula, leucopunctata. Pedunculi terminales, paniculati unilori breves, erecti, villosi. Calyx vires. Corolla alba. Antherae flavent. Semina hirsuta.

Cal. communis cylindricus, sulcatus, squamis quinque, oblongis acutis, concavis, erectis.

Cor. composita uniformis. Corollulae hermaphrodite quinque aequales tubulose calyce duplo longiores.

Proptia ulundabuliformis, tubo foris villosulo longo, umbra quinqueddo, patentissimo, acuto.

Stam. Filamenta quoque capillata, brevia. Anthera tubulosa, cylindrica longitudine faucis corollae.

Pist. Germen lineare Stylus bifidus longitudine laeva corollae Stigmata duo, bifidissima, petala, corollam superantia.

Per. nullum. Calyx unmutatus.

Sem. siliaria linearis angulata. Pappus triridatus, petalis, cum calyce proprio alternante acuto.

Rec. rudum.

Crescit in Mexico. Floret in caldario aestate. Siliuntur caulis florens, succiusque flor.

301

COLUMELLA BIENNIS.

Non potui ad illum ex generibus cognitis reducere, unum novum feci in memoriam L. P. M. Columellae scriptoris de re rustica celeberrimi. Radix ramosa. Caulis biennis teres, pedalis, caeterno gracilior ad lentem minutissime villosus totus foliosus & ramosus rami superioribus fistigatis inferioribus brevissimis & saepe simplicifimis, quibus puncta in tabula representantur integra. Vel in aliis individuis rami superiores fistigati ut ergas elonganti subpedales ut pluma evadat bipedalis sed tunc ramuli in caulis decutu breviores illi solent plerique desiderari, ex una pluma ramuli pars fructigeri ad alia exuberat. Folia sunt sparsa, linearia, obtusa, ungerissima, carnosula lomentosa, plerumque caulibus biennibus & quibus unciarum longa rami breviora. Flores terminalia, subsessile, solitaria, erecta, paucis odore praesenti. Calyx unmutatus videtur. Corolla flavet, ad sinuam sub partem papillosa.

ERIGERON CHINENSE

Erigeron caule paniculato pedunculis axillaribus, subnullis foliis illis crassis inferioribus obverse ovatis, serratis

Ex Promontorio bonae Spei semina transmissa fuerunt sine titulo & solo cum monito, esse ex China. Planta annua, tota villosa, erecta, ex ramis paniculata, sesquipedalis. Caulis teres & levissimus. Folia sunt alterna, acuta venosa basi ovata obverse ovata basi longe angulata subperfoliata, inaequaliter serrata quaedam uterque utrinque vel in alterutro tantum utere ex dentibus uno profundius incisa & juncti a. Summa sessilia, anguste lanceolata inaequaliter, Pedunculi axillares & terminales uniflori vel biflori, graciles, erecti, plus minus seminales, omnino numerosi. Flores parvi inaequali. Calyx 5 lobus, viridis. Flosculi radii ligulati, filiformes, breves erecti, pallidi. Discus flavescit. Reliqua ad characterem Lunenseum sunt.

Ex China. Floret sub die aestate. Solitur caulis pars maxima

SINECIO LANCEUS

Sinecio corollis radiantibus foliis amplexicaulis glabris ad basin argute serratis & scabra, superioribus cordato-lanceolatis, inferioribus lanceolato-oblongis

Sinecio corollis radiantibus foliis lanceolatis basi cordatis amplexicaulis laevibus, argute serratis & caule frutescente. *At. bot. vol. 3. pag. 194.*

Caulis ex eadem radice perenni plures, annui, teretes, glabri, lanugine abscedente his utriusque sicut tota filios erecti modo simplicissimi modo ramosi a quatuor ad sex pedes alti raramus & ultra cauli. Folia alterna amplexicaula subcoriacea, glabra utrinque & pubescentia cum nervo medio in facie purpureo-acuta ad basin serrata & reticulata scabra superioribus amaranthinis & ingratis, summa cordato-lanceolata, reliqua lanceolato-oblonga nervis quinque unicus longa & utraque utraque parte lata. Corymbus compositus terminalis, erectus. Corollae radiantes, potentillinae-luteae.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret a Julio ad Octobrem. In tabula illustratur summa pars caulis florentis

VERBESINA PINNATIFIDA

Verbesina foliis oppositis serratis, decurrentibus paniculis corymbosis *Car. vol. 1. pag. 67. tab. 100.*

Ante decem annos semina sub Bidentis nomine titulo transmissa fuerunt cum esset Car. vol. 1. pag. 67. tab. 100. Verbesinae nuncius redire posse credo. Ex eadem ad huc corymbis effluunt plures utriusque a quibus ad unum pedes alti a de quibus unciali diametro cauli, alii duos, alii plures annos perennantes, erecti, teretes, lanugine utriusque sicuti ab utroque cum pauca medulla dure lignoli purpureo-lanceolata magnitudine sicuti utriusque quadrata. ut quadrangulares ad huc. Folia sunt

ARCTOTIS VIRGATA

Arctotis coronata varietatibus fertilibus annua, caule ramisque virgatis, foliis lanceolato-linearibus, integerrimis vel denticulatis, glabrescentibus.

Planta annua, tota in ramos virgatos paniculata, heri tripedalis, erectiuscula, debilis, tota ferme glabra. Caulis teres, striatus, pallide virens. Folia lanceolato-linearibus, acuta, subcanaliculata, sessilia, alternata, duas creve uncias longa, caulina minus minusve denticulata, reliqua plerumque integerrima & angustiora. Flores terminales, solitarii erecti, laetiori, diametri fere biuncialis. Calycis glabrescentis & virentis squamae exterioribus ovato tubulata & patentissima, interiores oblongae erectae in appendicem subrotundam concavam flavo-pallentem & scarosam terminatae. Corollulae radii scissurae scissurae utrinque flavae six nervis sedentibus, lanceolatae patentissimae, cum germine turbato & corinato squamis septem fere albidisque cum fimbria purpurea. Corollulae disci striles, plures etiam cavendae flavae cum umbra ferdida macula. Stigmata lila linearia longa truncata. Receptaculum villosum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Maio & Junio. Tabula sicut caulis partem summam & auctum germen cum calyculo proprio.

308.

CINERARIA LINIFOLIA

Cineraria pedunculata uniflora foliis linearibus, spatula, calyculo lobato *Less. G. B. pag. 765. Less. monoc. vol. 6. pag. 81.*

Caulis fruticosus, ramulosus, teres, a cicatricibus foliorum deperditorum scabriusculus, erectiusculus, susceffens, basi pollicem crassus, tripedalis. Folia conferta, sessilia, linearia, integerrima, acuta, canaliculata, depressa, supra sulco exarata, patentissima, virentia, mucalio. Pedunculi uniflori, axillares solitarii, filiformes, patentes, laxi, folia duplo longiores. Calyx glaber, virens, erectus, in septem vel octo nervis semiovatis acutisque fissus. Corollulae radii totidem, flavae, patentissimae. Discus concolor. Receptaculum breviter pateceum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Aprilis & Maio. Tabula sicut auctum.

309. & 310.

CARICA MICROCARPA

Carica foetida lobis integris, trunco nudo.

Dioca, tota glabra & lactescens. Caulis arboreus, simplex, ab octo ad duodecim pedes altus, basi diametri pollicem & ultra, cretae junior totus adultus superne tantum, cinereus & cicatricibus magnis albidisque a foliis desolatis inaequalibus, adultus nigricans & epidermale frondosum. Caulis nudo cum cicatricibus foliorum cum obtusis plerisque. Folia versus trunci summam spatia, approximata, patula. Petioli teretes, solidi, cylindrici vel & digitum minimum crassi, & dimidio ad integrum

sic septenaria, lobus omnibus semiovatis, acuminatis, integerrimis. In mare
 paniculati, axillares, solitarii, teretes, pappum columbinum crassi, in eadem planta
 vix diversae longitudine, alii pedales, alii triunciales. Flores scordari, brevissime pe-
 dicati. Corolla tubulosa, lobis quinque, lobis ovatis, acuminatis, integerrimis.
 eam quoque ampliat, rectus. Locus foris flavescens, intus pallidior, quinque
 discoide mtheria incumbens, ita in fauce corollae, vix extra hanc eminentia, alter
 crassi, ab uno ad septem flores pedicellatos sustinetes. In his perianthium omnium
 avellanae majoris volumine, obsolete pentagona, glabra, aurantiaci coloris, unde
 cularis, lene inodora, pulsam includens albam, subdulcem & fatuam. Semina plura,
 reberitima diu est silentium. Tota Lunensis Caricæ Fosopis Lynon
 peritur folium Crotonis mollecani, quod Alucites Forsteri est, & in caldaris
 nollis congregatur

Crescit ad Caricæ & in Chili, utrobique ab incolis dicta *Papaya de monte*. In

eadem fructescens, nunc foliis orbis, fructus longitudinaliter & transversim
 discissus, semina, & pars trunci inferioris

CARICA CAULIFLORA

Carica folioeam lobis pinnatifidis, tota trunco florifero.

Tota trunco florifero, lobis pinnatifidis, tota trunco florifero. Tota trunco
 florifero, lobis pinnatifidis, tota trunco florifero. Tota trunco florifero,
 lobis pinnatifidis, tota trunco florifero. Tota trunco florifero, lobis
 pinnatifidis, tota trunco florifero. Tota trunco florifero, lobis pinnatifidis,
 tota trunco florifero. Tota trunco florifero, lobis pinnatifidis, tota
 trunco florifero. Tota trunco florifero, lobis pinnatifidis, tota trunco
 florifero. Tota trunco florifero, lobis pinnatifidis, tota trunco florifero.
 ipsa praeterea saepe foliis ovatis, racemosis, aut brevissimi aut triunciales. Horum basi
 est tuberculum ignis in principio vix percipiendum, quod augetur saepe, quotiens

re a pedunculo caedit, post tres quatuorve annos incoincante & diserte ramofum eva-
 dit, tunc uncialis & longius, tandem una cum pedunculis ex apice folia protrudit, & novae
 la verum ramum mittitur, post annos aliquot trunco senescente, sed rariore etate minus
 crassum. Flores inodori. In maribus dextra perianthium quinqueidentatum, acutum, pa-
 tentissimum & minimum est. Corollae rubeae tubus levi suffunditur vitreo, sicut cyllindri-
 cus, sed rariore
 revolutae, tubo duplo breviores. Filamenta decem, plana, erecta, summo tubo co-
 corollae paulo longiora. Antherae ex flavo pallentes, oblongae, didymae, adhaere pa-
 rietis interiori filamentorum, in longioribus infra apicem in brevioribus multo demis-
 lati, erecti & corollae tubo triplo breviora, stigmata donati nullo vel simplici. In ar-
 bore feruntur ex similibus tuberculis, sed nunquam apud nos in ramis transcursibus,
 per totam trunci longitudinem pedunculi egrediuntur plusculi, teretes, uncialis,
 recli, uniflori. Floribus inodoris perianthium est minimum & quinqueidentatum
 pedala quinque, albidis, oblonga, acutula, uncialia, crassula, basi canaliculata & ere-
 ceterum plana & revoluta; germina ovalium, superne angustatum, viride, glabrum,
 obsolete pentagonum; stigmata quinque, alba, longa, apice bifida & acuta. Baccis
 ovalis, acuta, obtuse pentagonis, odorata, flava, pugni ad summam magnitudine, saepe
 unice, intus albidis, unifloris, pediculis. Semina numerosa, maculata, ovata,

Crescit ad Caracas, vocatur a viete alvum conspiciente dicta *Taperia*. In calda-
 rio feret totam aestatem & autumnum, hinc diverso tempore fructum maturans. Tu-
 berum ex semina duobus floribus ornatum, fructum integram, eandem longitudinaliter
 dissectura, auctaque flamma rufice & a laterè conspecta.

DIOSPYROS OBOVATA

Diospyros foliis alterna, obverse ovatis, utrinque glaberrimis

Caulis erectus, teres, tripedalis, pollicem crassus, fuscescens. Folia alterna,
 breviter petiolata, ex basi acuta obverse ovata, obtusa, integerrima, utrinque subtus
 venulosa, glabra, firma, paula, plus minus buncalia. Pedunculi axillares, solitarii,
 triflori, patuli, brevissimi. Flores brevissime pedicellati, inodori. Calyx viret. Co-
 rolla & flammae sordidi coloris. Solum mas floruit.

CAL. Perianthium monophyllum, subovatum, erectum, acute & inaequaliter quoque
 dentatum

COR. monopetalum, coriaceum. Tubus subovatus, calyce duplo longior, erectus. Lim-
 bus quadrifidus, tubo duplo brevior; lacini ovatis, obtusis, patentissimis

STAM. Filamenta octo, receptaculo inserta, subulata, erecta, tubo corollae breviora
 alterna longiora. Antherae erectae, longitudine filamentorum suarum

PST. Corpus discoideum seu geminis rudimentum. Stylus nullus. Stigma nullum

Crescit in Domingo. Floret in caldario Mayo. Tabula III. ramulum borentem
 aucta florem & genitalia

313.

DIOSPYROS DIGYNA

Diospyros foliis oblongis acutis integerrimis, utrinque glaberrimis coriaceis. Floribus axillaribus, pedunculatis.

Tota glaberrima, in horti caldario arbor decempedalis, florens a Maio ad finem Junii. Truncum non perficitur. Trunco diametro biuncialis erecto, cortice ex nigro fusco, striatulo, totoque tuberculis densis exasperato; ramis junioribus glabris & virentibus. Rami horizontaliter patent, aut recumbunt. Folia sunt alterna, breviter petiolata oblonga, acuta, integerrima utrinque glaberrima coriacea venulosa. Folia longiora unciuncialis adulta supra atrovirentia & sulcata late viridia juniora utraque ex flavo virentia. Pedunculi uniflori, axillares, solitarii, breves, crassi, recurvati ad dorsum ramorum. Flores inodori, sex unciates hermaphroditi & mares cum germen rudimento sine stylo, ceterum hermaphroditi similes. Calyx viret. Corolla albet. Germen & styli villosula sunt. Filamenta hirsuta.

Cal. Perispermium monophyllum, campanulatum, coriaceum, crassum, semiquinquefidum ut reliqua alidum acuta sinuosa acuta erecta.

Cor. monopetala, coriacea, crassa. Tubus ovatus, calyce duplo longior. Limbus parvus, marginis sinuosa acuta, reflexo-patenti limbo, numero lacunarum calycis.

Stam. Filamenta ab octo ad octodecim, filiformia, erecta, brevia, aua basi corollae, aua receptaculo receptaculo hirsuta. Anthea linearis, aua erecta.

Pl. Germen ovatum uncinatum. Styli duo, crassi, erecti, longitudine staminum. Stylis utroque.

Crescit in insula Ceibes. Culta in insula Mauritii vocatur *Faux Magellan*. Floret in caldario Maio & Junio. Ramus fistitur; tum pistillum, floz, auctaque pistillum & hirsuta.

314.

PISONIA OBTUSATA

Pisonia inerans, foliis obtusis.

Frutex totus glaber, sempervirens. Caules septempedales, pollicem crassi, scabrusculi, erectiusculi, debiles, teretes, cinereo-fusci. Rami plurimi, propenduli, pauci erecti. Folia brevissime petiolata, opposita, oblonga vel subovata, obtusissima, integerrima, coriacea, nuda, plus minus tres uncias longa, fuscunciam vel duas uncias lata, venulosa. Pedunculi communes terminales, subpaniculati, foliis breviores. Flores sessiles vel brevissime pedicellati, subaggregati. Corolla hirsuta, viridula. Stamina tota alba. Germen pallide virens, glabrum. Stylus & stigma alba.

Cal. nullus, nisi bracteolam unam alternamve minutissimam, corollae subjectam, calyci condis.

Cor. monopetala, tubulosa, cylindrica, erecta, ore unequaliter quadri-vel pluridentata.

Stam. Filamenta sex, subulata, basi dilatata, brevissima, erecta, octa ex receptaculo communi. Antherae oblongae, erectae.

KAMPFERIA LONGA

Kampferia caule foliis sterili

Radix perennis constat tuberculis pluribus dactylatis, teretibus, carnosis, al-

ac propriis geminis aromaticis exant, circiter duodecim ex eadem successive g-

plexantibus, erectis, pallida cum apice fuscescente, longitudinis diversis inter sese
 Calyx ligulis floribus duplex. Exterior inferus est spatha triphylla, membranacea,
 hyalina, pallida, erecta; valvula exteriore ovata, acuta, connivente, latissima, &
 fere unciam longa, duabus interioribus oblongis & angustis. Calyx interior est spatha
 supera, scilicet geminis imposita, monophylla, tubulosa, carnea, longitudine tibi co-
 rollae superae antice illa & patula, dorso in lobellum lanceolatum acutum erectum-
 que excurrent. Corolla supera, monophylla. Tubus longus, gracilis, cylindricus

canaliculatus acutius, baccatis, integerrimis, hinc laevibus, dorsali erecta, laterali-
 bus patulis vel etiam patentissimis. Interior basi infundibuliformis, dein truncatus,
 exteriori brevior, aequis duabus dorsalibus lanceolatis, acutis, erectis, pallentibus
 cum suffusa purpura, ejusdem longitudinis; lacinis antica purpurea, lineata, pat-

unctae, albae. Gemma oblongum, compressum, album. Stylus capillaris, longius

la sine pulvis, seminaque plurima, ut videatur fore capsula. Posteaquam omnes flores
 transierunt, ex pluribus tuberculis radicalibus solum procedunt, in duas spathas

bellida, subtus lineata & livida, supra costata & viridia cum disco futurauri,
 pediculis, striata, aromatica, orta ex petiolo canaliculato longo amplexante, qui
 omnes petioli eandem mentantur bipedales, foliis alternis, tandem pluribus, vel

Crescit in India orientali. In caldurio florit April. Tabula exhibet plantam Ro-
 scortum florem a tergo visum, calycem floris, calycem corollae cum gemma
 soluta, lignum auctum, & prima folia

SALVIA LAM FOLIA

Salvia polytachya. Caran. icon. vol. 1. pag. 17. tab. 77?

Crucis fastaticoll, plures, ramosi, tetragonl, calammu crassi, ad lentem sub
pubescentes, ramosi, erecti, quadripedales. Folia sunt opposita, ovata, acuta, fer-
rata, utrinque rugosa & ad lentem subpubescentia, subtus costata & venis
leviter odorata & insiti quosdam habentia, plus minus tres uclis longa, cum pet-
stiplo vel duplo brevioribus. Spica verticillata, terminales, ab una ad tres

villosum, striatum, viride, tridentatum, acutum. Corolla caerulea, calyce di-
plo longior. Galea oblonga, erecta, obtusa, connuens, foris villosa. Labium
tenussum, planiusculum, longitudine galeae, trilobum; lobis rotundatis, interme-
dio duplo latiori & bifido. Stigmatis lacunia altera erecta & brevior. Semina gl.

Crescit in Mexico. Floret in tepidario Decembri. Tabula exhibet sursum cau-
tem, & aucta perianthium corollae.

309

SALVIA REPENS

caulis lanceolato-linearibus, integerrimis, floribus spicatis, oppositis, foliis

Tota odorata oli, saporis subamaricantis tandemque aeris, & ad

penam columbinam crassis, albicantes, ad genicula stipulis lanceolatis oppositis,
velutis, apice novum planam producturas, sic ut brevis tota olla caulibus plena fir-

lia, ad oras per lentem pectato-cristata, insima nonnunquam serrata, unciam vel sex-
ma longa, saporis subamaricantis tandemque aeris, subcaudata. Spica termi-
lis, erecta, gemellis, truncialis. Bractea opposita, lanceolata, acuta, erecta, sub-
sillares ad flores cum aliis minus ad eandem latera. Flores solitarii, oppositi
brevissime pedicellati, rarius cum rudimentis florum aliorum interalium. Calycis
bulosi & bistriati lacunae tres, lanceolatae, acutae, erectae, fere aequales. Co-
rulla & calyce triplo longioris galea obtusa, connuens, erecta, foris villosa.

Crescit in Mexico. Floret in caldario Octobri & Novembri. Tabula sibi cau-
partem superiorem, foliorem, auctaque corollam, stylum, portionemque soli

310

IUSTICIA CRISTATA

Iusticia spica terminalibus tetragonis; floribus tetrandris; foliis creatis, oi-

lata, fusca. Folia feminalia basi cordata, truncata.

Crescit in Surate. In caldario flores aestate, fructificat Novembri. Tabula
bellum fructigeram, & folium feminale

314

CESTRUM HIRSUTUM

guttis; foliis lanceolatis, tomentosis, stipulis laciniatis

Totum fœtet. Caulis fruticulosus, teres, erectus, pollicem crassus, octopedalis,
villis incanis & hirsutis. Folia sunt alterna, lanceolata, utrinque

reclusa, lanceolata, lucida petiolo brevi & hirsuto. Stipulae utrinque ad folia ovata

floriferam, aucta glaberrimam corollam, pitillum, &

315.

CESTRUM CAULIFLORUM

paniculata, foliis ellipticis

bus aggregati plures, simplices, uniflori, teretes, glabr

viridis, campanulatus, semiquinquedidus, lacinus semiovatis, acutus, patentibus.
 Corolla alba, subtus leviter rosea, quinqueloba, patentissima; laciniis ovatis, acutis.
 Germen glabrum. Stylus hirtulus, albus. Sagua lateans. Fructus granoso uti in So-

late ignota. Sub die floret Julo & Augusto. In tabula ramis ferens & fructu latissimus.

334.

SOLANUM FERRUGINEUM.

Solanum a foliis aculeatis fructu quo aculeis peribit foliis latis & annatis & subtus ad nervos petiolisque aculeatis, acutis, tomentosis.

Caulis fruticosus, teres, cinerascens, basi pollicem crassus fuscus scaber & inermis, ceterum aculeatus, nanosus, erectus, quadripedalis. Ramis seniores digitum crassi caulique similes, juniores subtomentosi ferruginei & scabri; omnes armati aculeis sparsis, rectis, validis, ex basi lata & crasso subulatis, compressis, totis glabris. Inflorescentia alterna, utriusque concentrica, ferdide virentia, basi saepius cordata, acuta, sinuato-lobata. Laciniae interna dorso subincana & ad nervos media aculeata, petiolis internix teretibus & saepius aculeatis, majora una cum petiolis semipedalia, minima minima tubata & nonnunquam tantum repanda, primum prodeuntia coloris ferruginei. Racemosa in ramis, laterales in ramis, inferius, multiflora, tandem biunciales; flore ultimo tantum fructescente. Calyx tomentosus, inermis, acutus, viridis. Petalum album, patens. Fructus uti in So. late ignota. Ramis perennans glabra nigra nisi magnitudine.

Patria nihil ignota est. Sub die floret aestate, hibernum agens in tepidario. Si fuerit ramus hirtus.

335.

CAMPANULA LILIFOLIA.

Camp. a foliis liliifoliae. caulibus saepe hirtis floribus paniculatis, rotundis.
 Linn. Syst. pag. 206.

Ca. quatuor digitum crassum, hirtum, erectum, saepe teretibus. Laciniae ovatae, acutae, saepe hirtulae. Fructus granulosus, uti in So. late ignota.

Camp. a foliis liliifoliae. caulibus saepe hirtis floribus paniculatis, rotundis. Linn. Syst. pag. 206.

Camp. a foliis liliifoliae. caulibus saepe hirtis floribus paniculatis, rotundis. Linn. Syst. pag. 206.

Ex eadem radice perenni caules annuati uttoluntur plures, herbacei, erecti, fr. multo, & a quatuor digitum crassum, hirtum, erectum, saepe teretibus. Laciniae ovatae, acutae, saepe hirtulae, a tribus ad quinque uncias longa, sulcus costata & ad apicem hirtulae, uti in So. late ignota. Fructus granulosus, uti in So. late ignota. Pedunculi ab uncloribus ad triclones, bractea sulcata lanceolata & acuta, ad pedicellos uncloribus. Flores rotundi. Calycis superi & virentis foliola quatuor, linearis, uti in So. late ignota. Germen nullo modo hirtum. Fructus granulosus, uti in So. late ignota. P. in So. late ignota.

brum, triloculare. Autumnis, dum caules emarcescunt, folia sepe produunt
adriagium

Crescit in Sibiria & Tartaria. Floret sub die Mays & Junio

336

CAMPANULA OBLIQUA

is campanulato-rotata, laciniis obliquis

Ex radice biennis, ramifera & fibrosa capite atolluntur caules plures, her-
bacci, angulati, glabrescens, inferne cicatricibus a foliis delapsis asperi, erecti, tri-
pedales & ultra, calamus vel & digitus minimum crassi, tandem superne ramulis
acumen angustata, ferrata supra glabra, subtus ad nervos venasque principes lu-
tula & asperiuscula, venosa, omnia reflexo-pendula, a tribus ad quinque uncias lon-
ga. Superiora tantum minor evadunt, summa tandem bracteiformia & integerrima
Pedunculi axillares, breves, inferiores triflori vel biflori, reliqui uniflori, simul for-
mantes racemum pedalem. Perianthii foliola lanceolato-linearia, acuta, glabra, pa-
tentissima vel reflexa, geminae longiora. Corolla caerulea, campanulato-rotata, ad
totius longitudine calycis, laciniis lanceolatis, acutis, superne obliqua. Anthera
flavae. Germen torquatum, aratum, glabrum. Stylus caeruleus, longitudine corol-
lae. Stigma triduum, patens. Capsula turbinata, subpentagona, glabra, semencialis,
apice lateriter quinquevalvis. Semina minuta. Lacte odoris virosi foetel

Patriam ignoro. Floret sub die apud nos Julio & Augusto. Tabula repraesentat
caulis partem superiorem florantem, radicem cum caulibus truncatis, & capsulam

337

CAMPANULA PERUVIANA

et, hispida; corollis patulis. Linn. mant. vol. 2. pag. 204. Willden. spec. vol. 1. pag. 904

Tota succo lacteo virosi odoris foetel. Radix biennis, ramosa. Caulis
dense hispidus, teres & membranulis live costulis extantibus veluti angulatus, erectus,
tripedalis, basi digitus crassus, inferne ramis alternis erectisque auctus. Folia alter-
nataque hispida, serrata, rugosa, sessilia, superiora acuta, lanceolata, & a
obverse ovata figura longe versus basin angustata, & semipedalia. Flores in caule
misque longam densamque spicam referunt, sere sessiles, axillares, basi sepe br-
causa, caerulea. Pericarpium angulosum, hispidum, tri-vel quadriloculare
ligamentis. Semina minuta

Crescit in Promontorio homum Spel? Apud nos sub die floret Julio & Augusto.
In tabula semeliter per hunc annum fuerit

338

VOLAMANNIA JAPONICA

Sub hoc titulo in horti Germaniae colitur, & huc nulla fuit Spectabilissima, dum
dem radice caules sepe plures attolluntur fraticosi, erecti, villosi, inferne teretes,
superne cum ramis obtuse tetragonis, bipedales, & ultra. Folia sunt opposita,

tussata venisque extantibus transversis reticulata, semipedalia, cum petiolis teretibus
villosis potentissimis & semipedalibus. Fasciculi florum terminales, multilori, co-
vexuli, densissimi, sepe magni. Bractea subverticillares, lanceolatae, acuminatae
integerrimae, ad latera villosulae, bullulis elevatis in facie donatae, setidae. Perian-
thium monophyllum, semiquinquefidum, purpureum; tubo oblongo; laciniis lanceo-
latis, acutis, potentissimis, externae ad basin per maculas clareas ab unda ad tres
riogatis. Corollae monopetalae foris carnea & intus albae tubus subcyathicis,
ultra, longitudine calycis limbus divisus in lacinias quinque, obverse ovatas, rotun-
datis, patentissimas. Hae corollae exterior vix cohaeret cum altera corolla interiore,
etiam tubata, sed cujus limbus in numerosas dispersas lacinias inaequales, rosae

hanc germen observavi oblongum superumque cum stylo subulato corollaeque super
longitudine corollae, & anthera donatum incumbens

Crescit in Japonia. Apud nos in caleario floret aestate. Tabula sicut in
caulis florentis partem, & florem singularem

339

DATURA C. RATOCAULA

Datura pericarpus glabris, incrimibus, rotundibus, caule herbaceo, folia subtus

lis. subtus tomentosis, caule corniformi. Ortog. dec. 1. pag. 1

peripedales calamumque emittit. Caulis in plurimis nostris individuis consistit
cus, erectus, pollicem crassus glaber, manus, teres, purpuriflores, rose glauco ter-
us, modo simpliciter in ramos paucos alternos subdivisus, modo ad semipedalem ab-
litudinem tres quatuorve ramos principes subumbellatis emittens. Rami amplexus ca-
sunt, sed magis virescentes & successively gracilescentes, tandem tres pedes longi

cum conciliantem. Folia sunt aeterna, petiolata, ovata vel lanceolata, basi inaequalia
, crumque, pinnatifide sinuata, undulato, acuta, venosa, supra glabra & viridi
tomentosa & lacana, a tribus vel quinque nervis longa. Pedunculi axillares,

flor, foliari, breves, superne inserti, in flore erecti, in fructu cernui. Flores

glabrum, viride. Corolla calyce triplo longior, tubo quinquefido, incurvato, vire-
scente, limbo albo cum angulis cæcis violaceis. Geutalia gentis. Capsula obverse
ovata, obtusa, glabra, lucida, sordide virens, a pedunculo cernuo pendula, nucis
juglandis magnitudine. Hæc sumptuosa subquadrangularis est; nam dissepimentum te-

dia inferior pars ad fructus usque corticem porrigitur, cum hoc lidere concretum, in
perna autem parte angustior est, hinc a cortice libera, ut sit pericarpium inferne
rissime quadriloculare sit, superne biloculare. Hujus alterius dissepimenti utriusque op-
posito parieti versus corticem sive extimo adnascitur longitudinaliter receptaculum
carnosum album & apice coalitum, sic ut dissepimento hoc videtur rece-

luna secari mediana. Nuci quatuor in fructu immaturo observabiles naturam indicant
dit sua cum contentis numerosis seminibus. Dissepimenta tunc in fructu disparuerunt,
sicut in fructu immaturo.

Crescit in Cuba. Floret sub die apud nos æstive. In tabula sicut ramus Ro-
rens, & scissus fructus, pedunculus post delapsam fructum, & semen

STATICE PURPURATA

Off. pag. 301. Lam. Mart. pag. 59.

Statice caule folioso, foliis obovatis, mucronatis. *Thunb. prodr. pag. 54.*

Statice scapo dichotoma, paniculata, tereti, scabro, foliis lanceiformibus, mucrono-

Limonium frutescens Capis bonæ Spel, vulgaris nostrati simile. *Raj. fuppl. pag. 226.*

Caulis suffruticosus, teres, digitum maximum crassus, fuscus, erectus, ramulos
etiam ad sesipedalem altitudinem una cum ramorum parte inferiori persistens, in pri-
mo alterove ætatis anno fere nullus, ut caules tunc fere aphylli dici mereantur scapi
cum foliis foliis radicealibus. Caules sive rami florentes pennam columbinam crassi, te-
retes, inferne glabri, cæterum ad summities usque punctis asperati, inferne

Folia alterna, inferne approximata, in medio caule parva, cuneiformis, integerrima,
obtusis cum parvo mucrone, ex petiolo conalutato orta, triseriata, firmula, modo

die ramulis flexuosa & elongata secunda, sessilis, & singuli bractee amplectente

Crescit ad Promontorium bonæ Spel. Sub die floret a Julio ad Septembriam
hiemem æque in tepidario. Tabula sicut caulem florentem

RIBUS COPALLINA

Ribus foliis pinnatis; foliis integerrimis; costa alata; alis arcuatis

Ribus foliis pinnatis integerrimis, costa alata, alis arcuatis. Linn. Sp. Pl.

195

Ribus foliis pinnatis integerrimis, costa alata, alis arcuatis. Linn. Sp. Pl.

Ribus foliis pinnatis integerrimis, costa alata, alis arcuatis. Linn. Sp. Pl.

Copall. Quilimul. Herm. mex. pag. 45

Succo testet glutinoso & balsamico. Radix in ambitum reptat, & filivum su-
 ve prolixo producit. Truncus brachium crassius, octopetalis, totus ramosus, teres,
 mollis, ex fusco cinerascens, sequabili, sed punctis ferrugineis sparsis exasperato
 haec puncta in ramulis junioribus solas maculas siliant exiguas, quae deinde altissimis
 & ad lentem bifurcam desinentes conspiciuntur. Habent autem foli epidermi-
 di, quae una cum his a subjecto cortice viridissimo & illeso abstrahi potest. Folia sunt
 pinnata, pinnata cum impari, ut plurimum quinquejuga. Costa semipetala, villosa,
 teres, articulo-alata alis arcuatis nec linearibus. Foliola infima breviter petiolata,
 reliqua sessilia, lanceolata, acuta, integerrima, supra nitida leviter undata & saturate
 viridia, subtus multo pallidiora & costata, utriusque ad lentem villosa, doch
 & ressecoria ad duas uncias longa. Panicula terminalis in omnibus sere ramulis,
 aut minoribus ex summius foliorum alis, densa, magna, villosa, erecta. Flores me-
 merostrina, omnes hermaphroditi & steriles. Calyx viridis, vix villosus. Petala ob-
 longa, obtusa, cum viride alba, ad oras ciliolata, calyce triplo longiora, patentis-
 sima, villosa. Styli tres, etali, erecti. Stigmata capitata

Crescit in America septentrionali. Apud nos sub dio lucem perfert durissimam,

et in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi

RIBUS LUCANTIA

Ribus foliis pinnatis; foliis integerrimis; costa alata; alis linearibus.

Jam a viginti & pluribus forte annis arbucula haec colebatur in horto Schöner-
 bergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi
 Tunc in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi
 locus fuerat locata. Sed nullam ex radice processerat roborem, nunquam florebat,
 quotannis hieme perdebant ramos, duriore etiam partem aliquam trunci, quae omnia
 veram speciem arguere vischabant. Saui igitur ante quatuor annos, ut in horto
 Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi in horto Schönerbergensi
 huius, sempervirens, & flores copiosos Octobri produxit, sed fructum nullum. Foliola
 angustiora, magisque laevo lucida sunt, quam in copallina, tum etiam numero plura

RHUS ELONGATA

Rhus foliis ternatis, foliolis lanceolatis, acutis, integerrimis, glabris; ad oras
 serratis

Tota glabra & odoris terobinthaceae. Caulis fruticosus, teres, fuscus, pum-
 exasperatus, ramosissimus, erectus, septempedalis, pollicem crassus. Folia alterna
 petiolata, ternata, nitida. Foliola lanceolata, acuta, integerrima, firmula, ad oras serrata

plus minus ferecucialij. Petiolus teres. Panicula terminalis, elongata sive pyramidata
 erecta, plus minus quadrinerviata, ad lentem villosula. Bracteolae ad divisiones acu-
 tae, minutae. Flores an forte hermaphroditi. Steriles 7 inodori. Calycis virentis vil-
 losuli & profunde sceti lacinae sunt oblongae, obtusae & erectiusculae. Petala cum
 flavedine albent, ovata, obtusula, convexa & patentissima. Filamenta subulata,
 circa, petala breviora. Antherae subrotundae, divisae, flavae. Germen subrotundum,
 basi ante petala excurret in quinque lobulos. Styli brevissimi, erecti. Stigmata sim-
 plicia, acuta. Fructum non fert

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Apud nos floret Septembri & Octobri
 Siliuntur in tabula ramus florens & auctus Bos

RHUS UNDELATA

Rhus foliis ternatis, foliolis lanceolatis, subserratis, undulatis

Odor terebinthinaeae. Caulis fruticosus, ramosus, erectus, teres, fuscus, non
 scaber nec tuberculatus, quatuor vel quinque pedes altus, digitum crassus. Ramuli
 novelli subvillosi sunt, caeterum glabri. Folia alterna, petiolata, ternata. Foliola ses-
 silia, lanceolata, basi angustata, acuta, rigidula, undulata, ad oculum nudum gla-
 bera, ad lentem obsolete tomentosula, ad tactum levi asperitate donata, saepe
 serrata vel crenata, adque modo magna, modo minus, ut videantur saepe integerrima
 in superbus microphyllis. Petiolus marginato-canaliculatus. Paniculae axillares &
 terminales, erectae, vix biunciales. Flores glabri, omnes mares & steriles, sicut
 in superbus nondum vidi. Calyx scutulus & patentissimus viret. Petala oblonga &
 obtusa cum flavedine albent. Filamenta alba, subulata, erecta, petala breviora
 Antherae flavae. Germen nescit solum rudimentum, disco quinquelobato circumscissum
 Variat quam maxime foliorum magnitudine

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Apud nos floret Autumno. In tabula ex-
 hibetur tres ramuli variantes, unus florens; tum auctus Bos, utrinque spectatus

RHUS LUCIDA

Rhus foliis ternatis, foliolis sessilibus, cuneiformibus, laevis. *Linnae Syst. pag.*

Rhus foliis ternatis, foliolis ovatis, retusis, glabris. *Thunb. prodr. pag. 5*

Rhus africanum trifoliatum minus, glabrum, splendente folio *Thunb.*

Flaur. aln. pag. 319. tab. 219. fig. 9

Tota glabra & terebinthinacei odoris. Caulis fruticosus, teres, luscus, tuberculis asper, ramofus, diffusus, erectus, a quinque ad novem pedes altus, pollicem vel & caeterum crassus. Folia sunt alterna, petiolata, ternata. Foliola cuneiformia, sessilia, lucida, emarginata vel retusa, ceterum vel uniserrata, vel apiciterrenata, vel etiam rarius superiore dimidia parte creata, intermedia majore, ab apicali ad biuncualem longitudinem. Petiolus teres, subulatus. Racemi paniculati, terminales & in summis foliis axillares, erecti, foliis vix longiora, densi. Flores albi, a uno vix fere hermaphroditu. Calyx virel. Petala oblonga, obtusa, patentissima cum apicibus reflexis. Filamenta brevissima. Antherae breviter. Germen globosum, glabrum, viride. Stylus teres, patentissim. Stigmata capitata. Fructus subrotundi, compressi, pistilli magnitudinis, rugulosi, nitidi, aciculatos. Semen compressum. Varietatem

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret apud nos in tepidario hieme, Maris fructu... Tam... in borealis... sicut...
tam fructifera; & auctum utrinque Notem.

XYLOPHYLLA ELONGATA

X... pinnata linear-lanceolata... creata...
L... n...

Tota glabra. Caulis fruticosus, teres, erectus, striatus, determinate ramofus, ex fusco cinereis, a foliis delapsis cicatricibus inaequalis, sexpedalis, basi pollicem crassus. Folia sparsa, nunquam in ramos abeuntia, pinnata cum incisura, petiolata, sessilia, linear-lanceolata, basi angustata, creata, coriacea, utrinque collata. Pinnulae ovatae, basi angustatae, apice emarginatae, creatae, coriaceae, utrinque collatae. Petiolus teres, subulatus. Racemi paniculati, terminales & in summis foliis axillares, erecti, foliis vix longiora, densi. Flores albi, a uno vix fere hermaphroditu. Calyx virel. Petala oblonga, obtusa, patentissima cum apicibus reflexis. Filamenta brevissima. Antherae breviter. Germen globosum, glabrum, viride. Stylus teres, patentissim. Stigmata capitata. Fructus subrotundi, compressi, pistilli magnitudinis, rugulosi, nitidi, aciculatos. Semen compressum. Varietatem

haec coronata tribus trifida vel alius inseris. Capsulae glabrae
Crescit in India occidentali. In caldario floret diverso tempore. In tabula re
presentatur ramus florens, dein aucti flores utriusque sexus

patentissimum cum oris inflexis. Carina bipetala oblonga obtusa. Alacrae & folia
limbo, praeter ungues nulla appendicula instructae. Stamina decem, libertina, An-
theris incumbentes. Legomena ab una ad duas uncias longum, aere, rostratum
compositum, & abrum plus perium inter angula semina intracum, utrum de
mina oblonga. Radix fetes

Crescit in Japonia, apud nos sub dio florens Julio & Augusto, frutescens Octo-
bris. Tabula hinc amulum Berratum plurima legumini. et frutescente figura, & tra-
mura

354.

ZYGOPHYLLUM RETROFRACTUM.

Zygophyllum foliis conjugatis, sessilibus, foliolis obverse ovatis, integerrimis
fruticoso, ramis scoloribus retrofractis

Zygophyllum retrofractum. *Dank prodr. pag. 80?*

Totum glabrum & rugulatum. Caudes fruticosi, plures, quadripedales, basi cala-
mum digitumve crassi, ramuli, distuli, teretes, folci. Rami juniores virides, subangu-
lari, seniores retrofracti. Folia sunt opposita, sessilia, conjugata, ad basin usque di-
vifa, cuneiformia ve. obverse ovata. apice rotundata, integerrima, nitida, carnosula,
plus minusve tenuicula. Stipulae lanceolatae, acutae, parvae. Pedunculi unilori axil-
lares, solitarii, folis paulo longiores. Perianthium parvum viret. Petala unguiculata
& calyce multo longiora flavent. Nectarii flavescens squamis oblongae & ad 1/2
cilio ciliator filamentis basi interne adhaerent. Germen subrotundum & quinque-
lobum viret. Capsula subrotunda, penninguicloba lobis carinatis, fusca, glabra
non ovata, atra, nitida. Liliata Zygophy in sessi folio folis ad marginem
frabula, petalis ad apicem non erantia nec ad basin macula puricante nigritia, &
caudibus

Crescit ad Promontorium bonae spei. Floret sempervirens in tepidario autumn-
si. Tabula hinc amulum Berratum plurima legumini. et frutescente figura, & tra-
mura

355.

ARENARIA GLANDULOSA

Arenaria foliis lanceolatis, caulibus diffusis, calycibusque capitato-
villosis

Caulis, ramuli, folia, pedunculi & calyceae villis capitatis dense obsidentur. Ex
ramulis tenuibus & quibusdam... ad basin penonni columbinam crassi. Folia sunt opposita, sessilia, linearia, integerrima,
obtusula cum mucrone, subtus convexa, supra plana, villosula, potentissima, lon-
giora uncialia. Stipulae membranaceae, parvae, pallidae, ex lato & sessili basi acuminato
Pedunculi unilori, terminales, erecti, solitarii, ad quorum basin ramuli noviproducti
ut tunc evadant axillares. Calycis virentis foliola ovata, obtusula, concava, patentissi-
ma. Petala alba, obverse ovata, concava, integra, potentissima, longitudine calycis
Stamina decem, petalis breviora. Styli tres. Capsula oblonga, glabra, unilocularis.

quae trilobata. Semina numerosa, minuta, fusca, subrotunda cum margine nigro
naceo albo, depresso.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret & fructificat aestate. Siliuntur pars
caulis, & aucta dos & fructu.

336.

OXALIS PURPURATA.

Planta ad lentem tota villosula. Bulbus subrotundus, fere nucis areolae
tudine, cortice ferrugineo vestitus, ex fibrillis radicalibus & stolonibus sub terra rep-
petitis, siliis, fibrillis radicalibus auctus, terminatus in umbellam foliosam. Folia
ternata, plerumque. Petiolus basi breviter articulatus, teres, duas tresve uncias longus,
penula columbinae crassitie vel gracilior, leviter purpurascens. Foliola obverse corda-
ta, crassula subsessilia, ad oras villosula ciliata, supra virentia, subtus saturate sa-
pida, semunciam longa utaque, nondum evoluta foris villosa sericea & alba. Scapus
fere nactus, ad basim articulatus breviter, teres, pallidus, sesquipedalis & ultra
et umbelliferus. Pedunculi a quoque ad septem, uncialis, erecti vel patuli, uniflori,
mutuo succedentes. Involucrum lobata parva, parva, imbecillata, villosula. Calyx
lobis lanceolatis, acuta, integerrima, hirsuta, ciliata, erecta, virentia cum sul-
fuso superne rubore. Corolla calyce quintuplo longior, subcampanulata, tota alba
vel obsolete carnea. Ungues ipsa basi externe flavescetes. Laciniae emiciformes, ro-
tundatae, integerrimae, patentissimae. Filamenta basi vix cohaerentia, glabra, inter-
dentata, aequalia, exteriora breviora, aequalia. Antherae ovales
luteae. Germen oblongum, hirsutum, viride. Styli longissimi, plus duplilibus pau-
perisque

Planta ad lentem tota villosula. Bulbus subrotundus, fere nucis areolae
tudine, cortice ferrugineo vestitus, ex fibrillis radicalibus & stolonibus sub terra rep-
petitis, siliis, fibrillis radicalibus auctus, terminatus in umbellam foliosam. Folia
ternata, plerumque. Petiolus basi breviter articulatus, teres, duas tresve uncias longus,
penula columbinae crassitie vel gracilior, leviter purpurascens. Foliola obverse corda-
ta, crassula subsessilia, ad oras villosula ciliata, supra virentia, subtus saturate sa-
pida, semunciam longa utaque, nondum evoluta foris villosa sericea & alba. Scapus
fere nactus, ad basim articulatus breviter, teres, pallidus, sesquipedalis & ultra
et umbelliferus. Pedunculi a quoque ad septem, uncialis, erecti vel patuli, uniflori,
mutuo succedentes. Involucrum lobata parva, parva, imbecillata, villosula. Calyx
lobis lanceolatis, acuta, integerrima, hirsuta, ciliata, erecta, virentia cum sul-
fuso superne rubore. Corolla calyce quintuplo longior, subcampanulata, tota alba
vel obsolete carnea. Ungues ipsa basi externe flavescetes. Laciniae emiciformes, ro-
tundatae, integerrimae, patentissimae. Filamenta basi vix cohaerentia, glabra, inter-
dentata, aequalia, exteriora breviora, aequalia. Antherae ovales
luteae. Germen oblongum, hirsutum, viride. Styli longissimi, plus duplilibus pau-
perisque

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Novembri & Decembri. Tab-
representat totam plantam florentem, auctaque calycem & genitalia

337.

CLEMATIS FLORIDA

Clematis florida, unguis catinae, flos, hirsuta, tetrandra, perianthium albu, fructus
baccatus, semina numerosa, minuta, fusca, subrotunda cum margine nigro
naceo albo, depresso.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Novembri & Decembri. Tab-
representat totam plantam florentem, auctaque calycem & genitalia

Planta ad lentem tota villosula. Bulbus subrotundus, fere nucis areolae
tudine, cortice ferrugineo vestitus, ex fibrillis radicalibus & stolonibus sub terra rep-
petitis, siliis, fibrillis radicalibus auctus, terminatus in umbellam foliosam. Folia
ternata, plerumque. Petiolus basi breviter articulatus, teres, duas tresve uncias longus,
penula columbinae crassitie vel gracilior, leviter purpurascens. Foliola obverse corda-
ta, crassula subsessilia, ad oras villosula ciliata, supra virentia, subtus saturate sa-
pida, semunciam longa utaque, nondum evoluta foris villosa sericea & alba. Scapus
fere nactus, ad basim articulatus breviter, teres, pallidus, sesquipedalis & ultra
et umbelliferus. Pedunculi a quoque ad septem, uncialis, erecti vel patuli, uniflori,
mutuo succedentes. Involucrum lobata parva, parva, imbecillata, villosula. Calyx
lobis lanceolatis, acuta, integerrima, hirsuta, ciliata, erecta, virentia cum sul-
fuso superne rubore. Corolla calyce quintuplo longior, subcampanulata, tota alba
vel obsolete carnea. Ungues ipsa basi externe flavescetes. Laciniae emiciformes, ro-
tundatae, integerrimae, patentissimae. Filamenta basi vix cohaerentia, glabra, inter-
dentata, aequalia, exteriora breviora, aequalia. Antherae ovales
luteae. Germen oblongum, hirsutum, viride. Styli longissimi, plus duplilibus pau-
perisque

Planta ad lentem tota villosula. Bulbus subrotundus, fere nucis areolae
tudine, cortice ferrugineo vestitus, ex fibrillis radicalibus & stolonibus sub terra rep-
petitis, siliis, fibrillis radicalibus auctus, terminatus in umbellam foliosam. Folia
ternata, plerumque. Petiolus basi breviter articulatus, teres, duas tresve uncias longus,
penula columbinae crassitie vel gracilior, leviter purpurascens. Foliola obverse corda-
ta, crassula subsessilia, ad oras villosula ciliata, supra virentia, subtus saturate sa-
pida, semunciam longa utaque, nondum evoluta foris villosa sericea & alba. Scapus
fere nactus, ad basim articulatus breviter, teres, pallidus, sesquipedalis & ultra
et umbelliferus. Pedunculi a quoque ad septem, uncialis, erecti vel patuli, uniflori,
mutuo succedentes. Involucrum lobata parva, parva, imbecillata, villosula. Calyx
lobis lanceolatis, acuta, integerrima, hirsuta, ciliata, erecta, virentia cum sul-
fuso superne rubore. Corolla calyce quintuplo longior, subcampanulata, tota alba
vel obsolete carnea. Ungues ipsa basi externe flavescetes. Laciniae emiciformes, ro-
tundatae, integerrimae, patentissimae. Filamenta basi vix cohaerentia, glabra, inter-
dentata, aequalia, exteriora breviora, aequalia. Antherae ovales
luteae. Germen oblongum, hirsutum, viride. Styli longissimi, plus duplilibus pau-
perisque

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Novembri & Decembri. Tab-
representat totam plantam florentem, auctaque calycem & genitalia

338.

Crescit in Japonia. Apud nos in caldariis floret a Maio ad finem Julii. Tabula
 sicut ramum florentem, & seorsum florem ex alia individua planta maxime plen

TRICHRUM ABUT LODS

Trichrum caule fruticoso, foliis cordatis, acuminatis, dentatis; racemis axillaribus
 Trichrum foliis cordatis, dentatis, acuminatis, racemis lateralibus, rotantibus.

Totum odoratum est. Caules ex eadem radice plures, fruticosi, ramosi, er-
 debiles, ex cinerea fuscescentes, villosi, basi teretes digitumque crassi, superne tetra-
 goni, a quatuor ad septem pedes alti, ramulis junioribus viridibus mollibusque. Fo-
 lia sunt opposita, tota villosa & mollia, cordata, acuta, serrato-dentata, rugosa, lon-
 ga semipedalia cum petiolo duas tresve uncias longo. Racemi axillares, solitarii,
 simpliciter, densi, villosi, secundi patuli vel erecti, oppositi, hirsuti, duas tres-
 ve uncias longi. Pedicelli breves, filiformes, villosi, erecti, sustuli bractea lanceola-
 ta imbricata & eaduce. Perianthium oblongum, viride, villosum, quinque-dentatum,

lobida, dein flavescens, rugosa, calyce multo longior. Galea filis cum lamina obtusa
 intorsum porrecta. Labii trilobi lacina media obtusa, magna, propendula, latera-
 res oblongae, parvae. Genitalia genitalia. Calyx in fructu persistit, rotundatur & con-
 trahit. Semina sunt quatuor, subrotunda, parva, fusca

Crescit in Canariis. Floret apud nos Aprilis & Maio. Exhibentur in tabula ra-
 mus florens, & racemus fructifera

PROLIS SALVIAE FLIA

Prolis foliis lanceolatis, crenulatis, tomentosis; bracteis calyceque tomentosis, c
 tu fruticoso

Caules fruticosi plures ramosi, teretes, sic debiles ut sese sponte sustinere ne-
 queant, sexpedales, seniores fusci glabri & digitum pollicemve crassi, juniores laevi-
 gnosus & albi. Folia sunt opposita, petiolata, lanceolata, acuta, crenulata, utrin-
 que rugosa & mollia, subtus utraque, dorsalis ad basin angustata & acuta, reli-
 qua lanceolata, acuta, integerrima, rigidula, tomentosa, subincana, erecta, calycis
 longitudine. Perianthium tomentosum, subcoriaceum, dentibus lanceolatis & acumi-
 natis, pressis, albus. Galea rubra. Labii superioris for-
 tis, acina media magna, subrotunda, emarginato

Patriam ignoro. Floret ab Aprilis ad Augustum. Tabula representat ramum flo-
 rentem.

LANTANA RECTA

Lantana recta L. *Spec. bot. vol. 2, pag. 33*
 oblonga; pedunculis folio longioribus. *Art. bot. vol. 2, pag. 33*

Jam a plurimis annis hic frutex in hortis nostris culta sub hoc titulo fuit, quem non merito, quamvis vacillansem, quam ad aliam speciem convergentius amandare nequeam. Caulis plures, fruticosi, sexpedales, ramosi, teretes, asperiusculi, erecti, nerei, princeps uncialis diametri, laterales digitum crassi, ramis tenuioribus cauli similibus, junioribus obsolete tetragonis, asperis, ad lentem villosulla, & virentibus. Folia sunt opposita, breviter petiolata, lanceolata, acutula, obtuse & minutissime serrulata, utriusque asperiuscula, laevi venis reticulata, dorso rugosa, trita odorata ac grate aromatica, biuncialis. Pedunculi axillares, solitarii, ad lentem villosull, erecti, foliis modo breviores, modo longiores. Spica subrotunda, depressa. Bractea lat-

pa globosa, dulces, rubropurpurea

Crescit in India occidentali. In calidario floret totam aestatem. Tabula repraesentat ramum florentem & fructiferaem.

LANTANA LAVANDULACEA

Lantana lavandulacea L. *Spec. bot. vol. 2, pag. 33*
 bracteis tuberculatis, subrotundis, acutis. *Willden. spec. vol. 3, pag. 317*

Tota grate odoratissima. Caulis ex eadem radice plures, fruticosi, erecti, saltem digitatim crassi, sexpedales, teretes, cuneati, scabres inferne glabri, ramoli toti. Rami debiles, asperi, juniores obsolete tetragonis. Folia sunt opposita, brevissime petiolata, lanceolata, acutula, serrata, scabra, plus minus biuncialis. Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, graciles, scabri, erecti foliis plerumque duplo bre-

Etiam si fons pieraque sibi opponantur, dantur tamen individua plures quibus toti quidam ramuli folia gerunt tera cum pedunculis tercia. Florum capitulum subrotunda, deorsu ovata, tandem ex productione cylindrica, non sicut bractea ad singulos flores late ovalis, acutae, villosae, concavae, virides. Perianthium hirtum, semibifidum in lacinas subrotundas & acutas, parvas, albidum. Corolla

baeca subrotunda, bifidata, bilocularis, siccis, dispersis

Patriam ignoro. In calidario floret totam aestatem. In tabula videntur caulis florantis pars summa; capitulum fructiferae, baeca, & una baeca, bractea utriusque

PENTSTEMON CAMPANULATUS

Pentstemon campanulatus L. *Spec. bot. vol. 2, pag. 223*
 antheris, omnibus argute serratis. *Willden. spec. vol. 3, pag. 223*

Chelone campanulata. *Cavan. ic. vol. 1. pag. 13. tab. 29*

Cyclone campanuloides. *Androm. reper. pag. 40. tab. 30.*

Ex radice perenni caulis atollitur bipedalis, teres, glaber, erectus, inferius
scissilis, linearis-anceolata, argute serrata, acuminata, glabra, longiora du-

oppositi, erecti, uncinates, biddi & biflori, vel trifidi & triflori cum bracteis ad
villosam, sessili majori. Flores inodori, secundi, subsessile. Pedicelli, calyx &

subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

RIGNONIA CAPREOLATA

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

caulis, subrotundus, obtuse, fere squales; tres lobis inferioris interno ad ortum barbata

MIMULUS GLUTINOSUS

Stem. *Walden. Spec. vol. 3. pag. 361*
Walden. Spec. vol. 3. pag. 361
Walden. Spec. vol. 3. pag. 361
Walden. Spec. vol. 3. pag. 361

Caulis fruticosus, tripedalis, teres, totus ramifusus, basi digitum crassus, raso-
 longa, obtusula, serrulata, glutinosa, ad lentem villosula, subtus costata, fascicu-
 clalis. Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, uniflori, vix semiclauiati. Flores sub-
 odorati. Perianthium uncialo, viride, glutinosum, persilens, monophyllum, tubulo-
 superiori longiore. Corollae haec tubus gracilis, cylindricus, calyce brevior. Fauces
 compressa, pucotula, calyce longior, amplior. Labii bilabiati & potentissimi ad
 superius semibifidum, obtusum, latius, in utroque ore exteras excavum. Labii infe-
 rioris. Antherae aurantiacae, didymae. Germen oblongum, teres, viride, glabrum.
 Stylus capillaris, fauce longior. Stigma biancellatum, orbiculare. Capsula subin-
 na, acuminata, tota calyce emarcescente inclusa, subbilobata, biloculari, bivalvia. Se-
 mina numerosa, oblonga, acuta, minima.

Patria mihi ignota est. Tabula siliis caulis partem florentis, corollam, capsulae
 calyceque cum inclusis capsulae emarcescentis.

MIMULUS DIVARICATUS

Stem. *Walden. Spec. vol. 3. pag. 361*
Walden. Spec. vol. 3. pag. 361

Caulis fruticosus, teres, erectus, fuscescens, digitum crassus, sesquiped-
 nodulati, purpurascens villosque albo pubescentes. Folia sunt alterna, pinnata cum
 impari, inferiora paucijuga a duobus jugis ad quatuor, dein quinquajuga, extrema in
 ramis sexjuga & septenjuga. Costa ab una ad tres uncias longa, antica ferdida pur-
 purascens. Foliola oblonga, obtusa, integerrima, breviter petiolata, facie glabra, dor-
 so villosa. Stylus linearis, acuminata, hirtula, fuscescens, gemellae. Spicae axi-
 lares, solitariae, subsessiles, erectae, densissimae, tandem triunciales. Flores brevissimae
 pedicellatae, anguli bracteola stipulis simili sessili, penduli, rubri. Calycis plus rubris
 lutei & sanguiniflori dentes unguiculati, erecti, acuminati, infimo longior.
 Vexillum subrotundum, integerrimum, planum, erectum. Ala obverse ovata, ante
 germinem, basi angustata, concavae, parvae. Carina ovata, acuta, potentissima.

Receptaculum paleaceum
 Crescit ad Promontorium bonae Spei. Apud nos floret Augusto. Tabula 0817
 num. 2000.

373.

COREOPSIS FERULAEFOLIA

Coreopsis herba biennata pubes lincan-angustata pinnatis odis latitudine
 pinnatis

Tota glabra est. Ex radice perenni caules quotannis auolluntur plurimi, her-
 bacei, erecti, & quatuor ad septem pedes alti, inferne digitata crassi, teretes, folios,
 Kani oppositar. Folia sunt opposita, bipinnata, patentissima vel reclinata, et pe-
 Calyx communis duplicatus. Squamae exteriores virides, lanceolatae, serratae, revo-
 Discus concolor. Et alia generis
 vram ignoro. Agit etatem sub dia. Floret in tepidario Novembri & Decem-
 bri. Sifiter para summa caulis

374

COREOPSIS PARY FLORA

Coreopsis foliis bipinnatis, lanceolatis, oppositis, radice annua

Planta annua. Caulis erectus, ramosus, teres, ferme glaber, tripedalis, cala-
 mum crassus. Folia opposita, breviter petiolata, glabra, patentia, tres quatuorve
 in disco hermaphroditu plures, lutei. Anthera fusca. Et caetera generis
 Sub dicto titulo semina accepti. Patriam ignoro. Floret in tepidario a Septem-
 bri ad Novembriam. Exhibetur para

375

HELIANTHUS TUBAEFORMIS

Helianthus tubaeformis
 Helianthus tubaeformis
 Helianthus tubaeformis

cum; squamis lanceolatis, acutis, concavis, erectis, distinctis. Corolla flava cum
 pilis, aequali. Cuscutula hermaphrodita multa radices. Linnæus in radice abscis-
 sione. Propria hermaphrodita tubulosa, unguis quinquefidus, & nonnullis ca-
 lycinis. Propria semine sigulata oblonga obtuse tridentata, patentissima lamina
 reflexa, et hermaphrodite germina uncare, pappo longo lanato coronatum. Stylus fi-
 guratus, unguis corollæ. Squamæ capitulum. Semina nuda. Pappus ovale,
 subangulum pappo coronatum unguis brevis. Stylus lanatus, longitudine
 si squamis unguis. Semina tubulosa ad maturitatem non perveniunt. Nec p-
 tuculum planum, lanatum.

Crescit ad Promontorium bonæ Spæ. Floret Septembri & Octobri. Tabula
 representat ramum borentem, & auctum germen ex Linnæo & Juss.

378.

ARCTOTIS GRANDIFLORA

A totis flosculis radiantibus ferilibus, caule suffruticoso; foliis pinnatis subtomen-
 tosis, superne recurvatis, pedunculo longissimo.

Caulis suffruticosus, parum ramosus, teres, erectiusculus, striatus, villosus, in
 pedunculum pedalem terminatus. Flosculi radii per totam circumferentiam
 tubulosa lamina tridentata inflexa semipedata, pappo dilatato lanato
 si squamis unguis. Stylus unguis. Squamæ capitulum. Semina nuda. Pappus
 ovale, subangulum pappo coronatum unguis brevis. Stylus lanatus, longitudine
 si squamis unguis. Semina tubulosa ad maturitatem non perveniunt. Nec p-
 tuculum planum, lanatum.

Crescit ad Promontorium bonæ Spæ. Floret Junio. Siliquis caulis pars supe-
 rior, flos flosculum a tergo vilis, & auctum germen calyculatum.

379.

ARCTOTIS MACULATA

Arctotis flosculis radiantibus ferilibus, caule suffruticoso; foliis pinnatis, con-
 fertis, subtomentosis; corollæ radii interno albidis & ad apicem maculatis.

Caulis suffruticosus, pollicem crassus, duas tresve uncias longus, ramosus, ex
 cinereo fuscus, hinc herbaceus & brevi in pedunculos sulatus pedata, fere calanum
 crassus, teretes, striatus, villosus, erectiusculus & uniflorus. Folia conferta, longi-
 petiolata, crassata, inaequaliter pinnatifida, dentata, obtusula, costata, plapiuscula,
 subtus tomentosa & parumper lanata, supra ad lentem hirsutula, longiora decem
 caulis pinnatis oblongis distantibus. Flosculi radii per totam circumferentiam
 linearis & ab una ad tres uncias longa. Flores odorati, diametri triuncialis. Calycis
 glabriusculi septem extimæ in apicem subulatum deflexi, interiores in lamina ovata,
 rotundatam, concavam, & hyalinam cum margine purpureo. In radio flosculi

numerosi, ligulati, acuti, feminei, fertiles, supra cum fevi suffusa flavedine albedi ad apicem luteo-maculati, ad basin atropurpurei, subtus lutei aut simpliciter aut cum
Hirsutis pubescentibus. Hirsuti pernicia hirsutum caeruleo proprio co. op. a. ann. hexaphyllo
to ex foliis omnibus integris & albis in disco florenti sunt hemisphaerici. Re-
ceptaculo & calyculo velut. Stigmata utraque intra lineam cavata, utra lobata. Recepta-
culum villatum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Mayo & Junio. Similitur planta Bo-
realis cum nucleo germine calyculato.

380.

ARCTOTIS PANICULATA

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule suffruticoso, toto paniculato, foliis
anguste oblongis, dentatis, subtus incanis.

Tota villosa est. Caulis suffruticosus, teres, striatus, basi digitum crassus, to-
tus paniculatus in ramos pedunculoque debilissimos & hinc quatuorversum flexos,
atque sic tripedalis. Folia sunt alterna, sessilia, angusta, obtusa vel acutula, raris
dentata. Pedunculus pinnatifidus dentatus. Pedunculi terminales, uniflori. Flores fere
bini aut terni. Calycis glaberrimi squamae exteriores in appendicem sabulatum, interio-
res profundam & hyalinam abeunt. Corollulae radii sunt femineae, lacteae, a-
nterioribus cum involucro ad basin atropurpureo, dorso albo cum fasciis duabus lon-
gis rubris. His gemma hirsuta coronatur calyculo proprio octophyllo ex
lobis oblongis aequalibus albis. Hemisphaerice in disco steriles cum limbo in-
gurgante, ligulate ferrugineo, sine calyculo. Receptaculum villatum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Mayo & Junio. In tabula exuber-
antibus. V. de hirsutis. Arctotis in ca. p. 11.

381.

ARCTOTIS DECUMBENS.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caulis decumbentibus, foliis lanceolatis,
dentatis, subtus incanis.

Caulis hirsutus, suffruticosus, teres, striatus, basi digitum crassus, totus
paniculatus in ramos pedunculoque debilissimos & hinc quatuorversum flexos,
atque sic tripedalis. Folia sunt alterna, sessilia, angusta, obtusa vel acutula, raris
dentata. Pedunculus pinnatifidus dentatus. Pedunculi terminales, uniflori. Flores
bini aut terni. Calycis glaberrimi squamae exteriores in appendicem sabulatum, interio-
res profundam & hyalinam abeunt. Corollulae radii sunt femineae, lacteae, a-
nterioribus cum involucro ad basin atropurpureo, dorso albo cum fasciis duabus lon-
gis rubris. His gemma hirsuta coronatur calyculo proprio octophyllo ex
lobis oblongis aequalibus albis. Hemisphaerice in disco steriles cum limbo in-
gurgante, ligulate ferrugineo, sine calyculo. Receptaculum villatum.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret a Julio ad Septembrem. Tabula representat caulium florentem, boream a dorso conspectam, & auctum germen cum calyculo suo

342.

ARCTOTIS REPTANS

Arctosis fasciculis radiantibus fortibus; radice reptante, caulibus suffruticosis ascendentibus, ramis erectis, foliis inferioribus sublyratis

Radix infra terram reptans caules promit adscendentes, suffruticosos, teretes, hirtos, hirtos, inferne purpurascens, calamus crassus, sesquipedales, ramulosos. Folia sunt alterna, sessilia, crassula, rigidula, subtus tomentosa & subincana, supra fere viridia & ad ientem anaurosa, dentata, inferiora obtusa sublyrata & cetera quatuorve unelas longa, reliqua acuta & subincolata. Pedicelli terminalis, nulli, erecti. Calycis glabri & subrotundi squamæ extimæ breves & lanceolato-subulatae, interiores ovatae & terminatae in appendicem subrotundam concavam obtusam & hyallinam. Corollulae radii lanceolatae, acutae, laciniae ex albo sulphureae cum basi nigra & deinde lutes, dorso flavescens cum disco purpureo, geminae, fertiles, quae germen sursum coronatur calyculo proprio octoplo ex se totis subovatis; obtusis, inferne purpureis, superne albidis. Corollulae disci hermaphroditae, steriles, oblongae & deficiente calyculo. Receptaculum villosum

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret Majo & Junio. Tabula exhibet caulis partem cum ramis florentibus, auctumque germen cum calyculo suo

383.

EPIDENDRUM ALOEFOLIUM

Epidendrum foliis caucibus oblongis, obtusis, superne latioribus. *Icon. syst. pag. 218. Act. upj. 1740. pag. 26*

Orcus abortiva, flore majore rubro, folio aloca. *Rudb. el. rot. 2. pag. 224*

Kamijara-maravara. *Rheed. mal. rot. 12. pag. 17. tab. 3*



Urtica arborescens hircifera. Flum. in pag. 259. tab. 260.

que aculeata. Braun. Jam. pag. 337

Tota venustissima. Truncus arboreus, erectus, supra medium divisus in ramos
crassos, teres, cinereus, aculeis horridus, carpinis crassus, octopedalis. Folia alter-
na, cordata, acuta, serrata, petiolata, nitida, costata, subtus reticulata, hinculis

us nullis. Stigma peltiforme

Crescit in Anstia & in Continente vicina in sylvis montana. Apud nos Borec
- caldario primo vere. Tabula affit ramum florentem, folium adules, & aucto-
rem eundemque dempto sigmate

URTICA ALSTUANS.

Lin. Syst. pag. 356. Lam. Spic. pag. 1397

Tota innocua, nec urtica. Radix annua, teres, pollicem crassa, duas tresve
longa, perpendicularis, ferdide pallens, hincis hirsuta ramosa. Caulis unicus,

latus auctus, tripedalis. Folia sulca opposta, reliqua alterna, longo petiol-
hirsuta, subcordata cum bascos lobulis parvis approssimatis, imo saepe vix ullis, et

hincis axillares, solitarii, subhorizontalis, expansi, toti hirsuti, alternatim

missa pinnata, in quorum centro locatur urecolus pallidus. Filament

Videtur omnino esse Urtica alstuan Linnaei, quavis trivari-
- cum, cum tota mitis sit. Al vero Blaregnvii sine esse nequit, cui tribuit

Quare haec duo synonyma Linnaei

Crescit Surinam. In calidario apud nos floret estate. In tabula videntur caulis

& femina.

389

OPHIOXYLLUM SERPENTINUM *Lin. Syst. pag. 94*

Ophioxylum foliis quaternis. *Lin. Flor. zeyl. num. 398*

Ligustrum foliis ad singula internodia ternis. *Burm. zeyl. pag. 141 tab. 6.*

Tajovana-Arsel-Podl. *Pluch. mal. pag. 81. tab. 47*

Radix muslicæ. *Rumph. arb. vol. 7. pag. 29. tab. 16*

Nescio, quomodo Botanici venerit in mentem, ex hoc Sirpe esse Lignum serpentinum, quod vel in errorem ducit, postquam Rumphiano nomine aptius dici leti-
diorthusa, vel à Latino serpens placet, Muslicaria. Tota glabra est. Caulis fruti-
cosus, parum ramosus, teres, erectus, bipedalis, calamus vel ad summum crassus
integerrima, plana vel convexa, subtus costata, semipedata, cum petiolo uicali fa-
gus, compressulus, terminalis, ad cuius totus deus caulis aut ramus ultra elongatur,
modori, erecti, uncales, calyces viridi aut rubello, corollæ tubo purpureo limbo-
que albo, antheris luteis. Quotquot per plures annos examinavi Hortos, factum
est, ut per hoc in meo Horto, quod per partem hanc in horto meo

Cor. monopetala. Tubus longissimus, cylindricus, circa medium in gibbum subro-
tundum amplius, erectus. Limbus quinquefidus, in fauce villosus, tubo tri-
plo brevior, lucinis ovatis, obtusis, patentissimis

Stylus capularis, erectus, longitudine filamentum. Stigma capitatum, ob-
longum, basi concavam, ore rotundo patens.

Stigma lobato. Stylus capularis, erectus, longitudine filamentum. Stigma capitatum, ob-
longum, basi concavam, ore rotundo patens.

Crescit in India orientali, in calidario floret Asia; tum etiam autumnis. Ta-
bula representat eandem adhuc simplicem florentem, aucta flamma in tubo corollæ
gibbo discillo conspicua, perianthium, & pistillum.

390.

MIMOSA FOETIDA

Mimosa mercuria, foliis bigemina quadrigenisque; spicis subgemella

Tota glabra & mercuria. Caulis arboris, ramosissimus, erectus, decempedalis.
hæc est semper in horto meo. Folia in horto meo præcipua sunt bigemina

vibus & rectis. Rami punctati. Folia alterna, bigemina. Petiolus communis vix

etque hi tenduntur in mucronem mucronem brevemque, ad dorsum inter foliola latum conspicuum. Foliola subsessilia, obverse ovata vel ovata, obtusissima, integerrima basi inferiore parumper oblata, ab una ad duas uncias longa. Racemus ter-

cia & inodorus, omnibus hermaphroditus, sessilis bracteis acutis & mucronatis. Pedic-

loribus plus minus quindecim. Calyx tubulosus, acute quinqueidentatus, ex flavo v-

corpus, capsularia, erecta, alba, petalo duplo longiora. Antheræ flavæ. Germen illic, pedicelatum. Stylus capillaris, erectus, longitudine filamentum. Stigma simplex, acutum. Legumen quatuor vel quinque uncias longum

Crescit in Guiana, Curacao, Martinica. Floret in calendario Junio & Julio. Scilicet tabula ramum florentem & auctum ferat

BIMOSA LEUCACANTHA

lis, subtrijugis, partibus a quadrijugis ad decemjuga, costa biglandulosa, floribus poly-

Tota glabra est. Truncus arborcus, decempedalis, carpum crassus, teres, en-

ga, partialia a quadrijugis ad decemjuga, foliis oblongis, obtusis, integerrimis, brevissime petiolatis, a tribus ad quinque lineas longis. Costa princeps ab unca ad

croneo subulato & rigidulum terminata, duabus glandulis unita planiusculis ex flavo sordentibus, altera inter duas terminales, altera infra pinas usinas modo ad ipsas pinas, modo remote ab eisdem in costa. Costæ partiales, dorso teretes, mucronatoque terminantur. Spine stipulares gemine, distinctissimæ, divergentes, albae & veluti eburneæ, subulatae, compressulæ, rectæ, validæ, semper solidæ, etate ligneæ & durissimæ, modo brevæ & graciles, modo humiliales & crassæ, idque in eisdem sepe ramis. Flores suaveolentes, in capitulum globosum collecti. Pediculi communes axillares simplices, & terminales racemosi. Alia capitula solos ma-

les, solos hermaphroditos continent, in receptaculo communi cylindrico & obtuso coactos, singulas bracteolæ lanceolata sessiles longitudine calycis. Illic est campanulatus, pallide viridis, oræ quinquefido rotundato. Corollæ monopetalæ, usund-

obtusæ. Filamenta numerosa, sic basi connata, ut sece distincta. Germen oblongum,

obtusum. Solo pistilli defectu mares ab hermaphroditis differunt

terosus, rubiginosus. In facinus francensis pollicem crassus rubiginosus, tomentus in frons rugum crassus quatuor uncias longus post tomentum sub albam fecellum ex viridi fusca. Genitalia alba. Drupe rubent cum pulpa dulci. Nux alba.

Crescit in India occidentali. In esdaria floret & frutescit omni anni tempore
 Tabula 394. marem cum truncata foliis, & 397. Lemniam cum eadem plerisque abstrahis
 exhibet

399. 400.

PTERIS LONGIFOLIA

Pteris frondibus pinnatis, pinnis linearibus, repandis, basi cordatis. *Linn. fl.*

Linn. II. *ramosa longissimis angulis & ad basin auriculatis foliis. Flum. su. pag. 4. v. 69.*

Loucheilla lineata, pinnis longissimis. *Petit. fl. 129. tab. 6. fig. 12*

Filix non ramosa, longissimis angulis & ad basin auriculatis foliis. *Flum. amer. pag. 12. tab. 14*

Radix fibrosa, decisa, longa, fusca, perennis. Stipites plures, erecti, paleis
 perfirmibus. Pinnis utriusque distinctis. Pinnis bisectionis & unia, erectissimis
 culis, pinnatis cum impari. Costa ferruginea, lisdem paleis donata, sed superiora
 versus furcillam pinnarum brevioribusque ut tandem tres nullis. Pinnae inferiores
 oppositae superiores saepius alternae. Plus minus quatuor & raris utrinque lanceo-
 lanceolatae, modo falcatae, modo minime, acutae, subsessiles, planae, saturate viren-
 te patentissime, basi duabus auriculis oppositis & divaricatis hastatae, ab infimis bre-
 vioribus & pinnatis. Cellulae longiores ut supra medium sunt quatuordecim. Linea
 versus superiorem non impet de resentes terminali sunt decem ad octiduum. Vires
 raris ad duas res utriusque duplicatae in qua superiorem ut in basile. Pinnarum pinnae
 profundas ut usque tenent ut normam congruentem & ut in pinnis. Pinnarum
 autem nota cum apertibus basibus & harum auriculis duplicatae. Margines deorsum
 & feruntur hinc inde. qui mare ut hinc sunt hinc deorsum & raris hinc ut
 apertis interduci. Pinnae tandem ipso decidant. Pinnae pinnae ut ex aliis abstrahis
 & velut truncatae. Pinnae etiam sunt pinnae paucae quaedam pinnae quae raris hinc ut
 essere hinc.

Crescit in Domingo ad Portum principis. Floret aestate. Tabula 399. Utraque
 tabellam cum frondibus truncatis, tabula 400. frondis majoris truncatae partem summam
 & feruntur pinnam in pollicis facie conspectam.



Ulex europaeus





Sal. hirsuta





Chelidonium purpureum





Urtica dioica









100



7. 1



Trichostema 11472 1851





Plantago lanceolata





Tranella





Psychotria undata



T 201



Begonia





Ulmus parvifolius





Helianthus scaberrimus






Erythronium flavum





Erythronium puberulum









Cercis flor. lanifolia





Fraxinus byzantina





Siphore n










Dianthus prostratus











T. 214



Urtica dioica





... ..





Euphorbia buxifolia.





Euphorbia peruviana





Verbena peruviana parviflora





Mesembryanthemum pecten.





Rosa marulifolia





1. Rose, " "





Cedus vaginatus





Thu. ill.





Stachys curvica





7 . . .

Andromeda sili, 100





Urtica dioica L.





2. *P. ...*



7 288



Maurandia semperflora.



T 200



Wartyaca lunata



724



R. lucida





Urtica dioica





Hamamelis virginica





Rubus abutiloides





Malva stricta





Acer rubrum







Verbena stricta





Malpighia nutans





Urtica dioica





Hesperis matronalis





Lyrodium complanatum





C. le mollis bonnis





Thalictrum mollis





Verbena officinalis





174

Senecio. l. m. w.





Verbena pinnatifida



75



Cast. sp. repens

1852






7 11

Arctostaphylos






Conium maculatum










Cecropia peltata





C. v. scutellaria







D. sp. nov.










Picoma obtusata





Ficus " "





///





Asplenium adnigrum





Hibiscus campylota





Mimulus





T. W. W.





Ficus virens





Spermatocarpus



T. 122



Ipomoea muricata





Cestrum latifolium



T. 2.



Cestrum cauleflorum





Handwritten notes in the upper left corner, possibly describing the specimen or the artist's observations.

Small handwritten mark or signature on the left side of the illustration.

Quercus agrifolia





C. ...





Cedrum uspaense





Cestrum peruvianum





... ..





Astrum edentispermum



T. 100



Arctostaphylos uva-ursi





Urtica dioica





Solanum ferrugineum





Campocoma liliifolia





Verbena officinalis






ampelodesmos maurandifolia



7.



Alnus incana Scop. var. *incana*





... ..





Halenia purpurascens











7340



Rhus glabra





Rhus copallina





Rhus longata





74

Genista tinctoria





Rubus









Phytolacca verticillata





Atropa theophrasti





Uyama n.





Coccoloba fagiifolia





L. h.





Zygophyllum retrofractum





Artemisia caudata L.



T 254



Trifolium purpureum





Leucanthemum fl. rub.









Phytolacca americana





L. ...





Lonicera xylosteum L.





1. 111. 11 111. 11





Thymus serpyllifolius



Tree



M. montana (L.) W.





Lonicera stramonifolia



1106



Styrium apiculatum





Centrosema ciliatum





Aster multiflorus L.





C. up. to n. deltoideum





Adiantum





Adiantum sp.



T. 372



L. maritima






Urtica dioica L.





Caryophyllus inflatus






Helianthus tuberosus





Ulmus reticulatus





Aster sp. with yellow





Arctostaphylos






Cirsium maculatum





Antennaria parviflora





Aster, des monts





Antennaria dioica





760

Epipactis atrorubens





P. speciosa Willd.





Castanopsis






2 // *Hydrocotyle*











T. 1804



Syzygium dum *serpentanum*









Wormwood with fls.

Wormwood
with fls.





Urtica dioica





Leucanthea





Mimosa pudica









Mimosa tenuiflora (Poir.) Benth.









Samolus medeolae





Adiantum longifolium





Pteris longifolia











July 17/26
Scherer 100 100



